

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضیات گسسته	رشته : ریاضی فیزیک	ساعت شروع : 10 صبح به افق تهران	مدت امتحان: 120 دقیقه
پایه دوازدهم		تاریخ امتحان : 1399 / 03 / 24	
دانش آموزان روزانه، راه دور و داوطلبان آزاد خارج از کشور در خرداد ماه سال 1399		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	

ردیف	سؤالات	نمره
1	با استفاده از روش برهان خلف، ثابت کنید اگر x یک عدد گنگ باشد، $\frac{1}{x}$ نیز عددی گنگ است.	1
2	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف) اگر برای دو عدد صحیح و ناصفر a و b داشته باشیم $(a, b) = 1$ ، می‌گوییم a و b دو عدد هستند. ب) اگر $a b$ ، مقدار $[a, b]$ برابر با است.	05 05
3	اگر $a 5m-2$ و $a 3m+1$ ، برای a چند جواب طبیعی وجود دارد؟	1/25
4	اگر باقی‌مانده تقسیم عدد طبیعی a بر 31 برابر 19 باشد، باقی‌مانده $(2a-1)$ تقسیم بر 31 را به دست آورید.	1/25
5	بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک دو عدد $4k$ و $16k^2 - 1$ را بیابید.	075
6	معادله سیاله $4x + 3y = 19$ را در نظر بگیرید. الف) نشان دهید معادله سیاله فوق دارای جواب است. ب) جواب عمومی معادله سیاله داده شده را بیابید.	1/75
7	در هر مورد، عبارت صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید. الف) تعداد رئوس یک گراف را (اندازه ، مرتبه) می‌نامیم. ب) گرافی را همبند می‌نامیم که بین هر دو رأس آن یک (مسیر ، یال) وجود داشته باشد. پ) اگر G یک گراف n رأسی باشد، مقدار $q(G) + q(\bar{G})$ برابر با $(n(n-1))$ ، $\frac{n(n-1)}{2}$ است. ت) گراف C_n تنها یک (دور ، مسیر) n رأسی دارد.	1
8	گراف G (شکل مقابل) را در نظر بگیرید. الف) $\Delta(G)$ و $\delta(G)$ را مشخص کنید. ب) دوری به طول 4 برای b بنویسید. پ) مکمل گراف G را رسم کنید. ت) $N_G(e)$ را با اعضا مشخص کنید.	2
9	در هر یک از حالات زیر در صورت امکان یک گراف r - منتظم از مرتبه p رسم کنید. در صورتی که ترسیم گراف امکان‌پذیر نبود، دلیل ارائه کنید. الف) $r=2, p=5$ ب) $r=3, p=7$	1
10	عدد احاطه گری گراف زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.	1/25
		
11	مجموعه احاطه گر مینیمال را تعریف کنید.	075
12	با ارقام عدد 1132881133 چند عدد 10 رقمی می‌توان نوشت. (ساده کردن پاسخی نهایی الزامی نیست.)	1

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضیات گسسته	رشته : ریاضی فیزیک	ساعت شروع : 10 صبح به افق تهران	مدت امتحان: 120 دقیقه
پایه دوازدهم		تاریخ امتحان : 1399 / 03 / 24	
دانش آموزان روزانه، راه دور و داوطلبان آزاد خارج از کشور در خرداد ماه سال 1399		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	
ردیف	سؤالات		
13	معادله $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 17$ چند جواب صحیح و مثبت دارد به شرط آن که $x_2 > 2$, $x_5 \geq 4$ باشند؟		
14	یک مربع لاتین 4×4 چرخشی رسم کنید.		
15	چند عدد طبیعی مانند n ، به طوری که $1 \leq n \leq 200$ ، وجود دارد که بر هیچ یک از اعداد 2 و 7 بخش پذیر نباشد؟		
16	الف) چند تابع پوша از یک مجموعه 4 عضوی به یک مجموعه 3 عضوی می توان تعریف کرد؟ ب) چند تابع یک به یک از یک مجموعه 4 عضوی به یک مجموعه 6 عضوی وجود دارد؟		
17	حداقل چند نفر در یک سالن ورزشی مشغول تماشای مسابقه کشتی باشند تا مطمئن باشیم لااقل 20 نفر از آن ها روز تولدشان در هفته یکسان است؟		
20	موفق باشید. جمع نمره		

حل سوالات ریاضیات سه خاج دانشور در نگاه 99 نوبت جمع

۱- فرض خلف: فرض کنید $\frac{1}{a}$ عدد نباشد پس توانست و $a, b \in \mathbb{Z}, a, b \neq 0$ و $\frac{1}{a} = \frac{a}{b}$

با یکدیگر کردن تاروی با داریم: $n = \frac{b}{a}$ پس a هم توانست. \times که این با فرض $\frac{1}{a}$ عدد نباشد a در تناقض است. پس فرض خلف باطل و حکم ثابت می‌شود.

۲- الف) نسبت بهم اول (a, b)

۳-
$$\begin{cases} a \mid \omega m - 2 \\ a \mid 3m + 1 \end{cases} \rightarrow a \mid -3(\omega m - 2) + \omega(3m + 1) \rightarrow a \mid -10m + 7 + 10m + \omega$$

$$\rightarrow a \mid 7 \rightarrow a = 1 \text{ یا } 7$$

۴- راه حل اول: $a \equiv 19 \pmod{31} \rightarrow 2a \equiv 38 \pmod{31} \rightarrow 2a \equiv 7 \pmod{31}$
 با ضرب در ۱۵

راه حل دوم: $a = 31q + 19 \xrightarrow{\times 2} 2a = 31 \times 2q + 38 \xrightarrow{-1} 2a - 1 = 31q' + 37$

$$\rightarrow 2a - 1 = 31q' + 31 + 6 = 31(q' + 1) + 6 \rightarrow 2a - 1 = 31q'' + 6$$

 با ضرب در ۱۵

۵- $d = (3k, 17k^2 - 1) \rightarrow \begin{cases} d \mid 3k \\ d \mid 17k^2 - 1 \end{cases} \Rightarrow d \mid 17k^2$

$$\Rightarrow d \mid 17k^2 - (17k^2 - 1) \Rightarrow d \mid 1 \Rightarrow d = 1$$

۶- الف) $(3, 3) = 1 \Rightarrow 1 \mid 19$

$3x + 3y = 19 \Rightarrow 3x \equiv 19 \pmod{3} \Rightarrow 3x \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 3x \equiv 4 \pmod{3}$


$\Rightarrow x \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow x - 1 = 3k \rightarrow \boxed{x = 3k + 1}$

$3(3k + 1) + 3y = 19 \Rightarrow 12k + 3 + 3y = 19 \Rightarrow 3y = -12k + 16 \Rightarrow \boxed{y = -4k + 5}$

7- الف مرتبه (c) مسير (c) (c) $\frac{n(n-1)}{2}$ (c) دور

8- الف) $\Delta = 3$ و $\delta = 1$

betfab (c)



$N(e) = \{a, b, f\}$ (c)



9- الف) $pf = a \times 2 = 10 = 2q \rightarrow q = 5$

ب) رسم گراف امکان پذیر نیست زیرا $pf = 7 \times 2 = 14 \neq 2q$ یا تعداد رئوس با هم زوج نمی باشد.

10- $\chi(G) \geq \lceil \frac{P}{\Delta+1} \rceil \Rightarrow \chi(G) \geq \lceil \frac{1}{3+1} \rceil = 2 \Rightarrow \chi(G) \geq 2$

$\{a, g\}$ معبره است $\Rightarrow \chi(G) = 2$

11- یک معبره است که با حذف هر یک از این ها گراف گسترده تر نباشد.

12- $\frac{10!}{4! \times 3! \times 2!}$

13- $\begin{cases} \chi_r > 2 \rightarrow \chi_r \geq 3 \rightarrow \chi_r = y_r + 2 \\ \chi_o \geq 2 \rightarrow \chi_o = y_o + 1 \end{cases}$

$\chi_1 + y_r + 2 + \chi_e + y_o + 1 = 17 \rightarrow \chi_1 + y_r + \chi_e + y_o = 14$

تعداد جواب صحیح مثبت (طوبی) $= \binom{n-1}{k-1} = \binom{10-1}{5-1} = \binom{9}{4}$

1	2	3	4
4	1	2	3
3	4	1	2
2	3	4	1

- 15

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| = |\overline{A_1 \cup A_2}| = |S| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2|$$

- 10

$$= 200 - \left[\frac{200}{2} \right] - \left[\frac{200}{2} \right] + \left[\frac{200}{2 \times 2} \right]$$

$$= 200 - 100 - 100 + 50 = 50$$

$$f: A \rightarrow B \quad (|A| = m \geq 3, |B| = 3) \xrightarrow[\text{توانستار}]{\text{توانستار}} 3^m - (3 \times 2^m - 3) \quad (\omega) - 17$$

$$= 3^4 - (3 \times 2^4 - 3) = 81 - 45 = 36$$

$$f: A \rightarrow B \quad (|A| = m, |B| = k) \xrightarrow[\text{توانستار}]{\text{توانستار}} \binom{k}{m} = \frac{k!}{(k-m)!} \quad (\omega)$$

$$= \frac{7!}{(7-4)!} = \frac{7!}{3!} = 350$$

$$k+1=20 \rightarrow k=19$$

$$n = \text{توانستار} = 7$$

- 17

$$\text{توانستار} = N = n k + 1 = 7 \times 19 + 1 = 134$$

توانستار