



کتاب  
تمرین امتحان

# فیزیک دهم ریاضی

رضا خالو، امیرعلی میری

پاسخ‌های  
تشریحی

سوالات  
امتحانی

سوالات  
تکمیلی

سوالات  
تألیفی

درس‌نامه  
سوال محور

## مقدمهٔ مؤلف

به نام خدا

سلام به شما دهمی‌های عزیز

سال دهم، سال ورود شما به مقطع جدید (دورهٔ دوم دبیرستان) رو تبریک می‌گیم.

سالی که شما احساس می‌کنید برای فرق دادن خودتون با شرایط جدید وقت کافی دارید. البته احساس چندان اشتباهی نیست اما با توجه به اینکه در طراحی جدید آزمون سراسری دانشگاه‌ها، سوابق تحصیلی یا همون نمرات امتحاناتون در آخر سال تأثیر مهمی داره شما باید از ابتدای سال به فکر این آزمون‌ها باشید. همون‌طور که ما به فکر بودیم و برای این موضوع کتابی با شرح حال زیر نوشتیم.

دانستان کتاب ما از این قراره که کتاب رو به ۶ قسمت تقسیم کردیم:

۱ درس‌نامه: امتحان نهایی در درس فیزیک معمولاً شامل دو بخش است، یک بخش حفظی با سؤال‌های جای خالی، تعریف کنید، درست و نادرست و ... از متن کتاب و بخش دیگر مسئله‌های محاسباتی.

الف) برای بخش حفظی، در درس‌نامه تمام قسمت‌های حفظی و مهم متن کتاب درسی را تحت عنوان «خط به خط کتاب درسی» و شکل‌های مهم کتاب را به صورت «عکس و مکث» آورديم.

ب) برای بخش مسئله‌ها هم، در هر درس‌نامه، مسئله‌ها را تیپ‌بندی کردیم و نکته‌های مهم برای حل مسئله رو در پاسخ اون نوشتیم.

۲ در هر فصل بعد از درس‌نامهٔ کامل، یک‌سری تمرین و کار در منزل برای شما قراردادیم تا با حل اون‌ها قدرت حل مسئله و آزمون دادن شما بالا بره. در بخش تمارین بیشتر، تمرین‌ها شامل چند قسمت بوده یعنی یک مبحث رو به چند صورت از شما پرسیده‌ایم تا هم شما و هم همکار عزیز ما یعنی معلمتون خیالتون راحت باشه این نمونه سؤال رو یاد گرفتید.

۳ برای محکم‌کاری بیشتر در آخر تمام بخش‌ها مسائل و سؤالاتی با سطح بالاتر گذاشته شده که این سؤال‌ها کمی سخت‌تر هستن. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که پس از مشورت با معلم این مسائل رو حل کنین.

۴ در بخش جمع‌بندی مسائل امتحانی بارم‌بندی شده هست که شامل سؤال‌های امتحانی کل فصل بوده و بارم‌بندی اون‌ها رو مشخص کردیم. در پاسخ این مسائل هم کلید تصحیح شبیه امتحانات آموزش و پرورش گذاشته شده. به‌طور مثال مشخص کردیم که کدوم فرمول باید نوشته بشه و هر بخش از پاسخ چه نمره‌ای داره.

**۵** یک سؤال مهم در آزمون نهایی، سؤالهای مربوط به آزمایش کنیدهای کتاب درسی هست که تمام این آزمایش کنیدها رو در آخر این کتاب و فصل به فصل برای شما قرار دادیم.

**۶** حل تمام مسائل و تمرین‌ها در پاسخ‌نامه به‌طور کاملاً تشریحی قرار داره.

در آخر باید بگیم این کتاب

«تمام آن چیزی است که شما برای ۲۰ گرفتن لازم دارید»

در پایان از تلاش صمیمانه کارکنان نشر الگو به ویژه خانم‌ها زهره نوری، شارونا قطبی‌نژاد و آقای محسن شعبان شمیرانی که ویرایش این کتاب بی‌یاری آنان امکان‌پذیر نبود و خانم‌ها فاضله محسنی و مریم احمدی برای تایپ و صفحه‌آرایی کتاب تشکر و قدردانی می‌کنیم.

رضا خالو - امیرعلی میری

## فهرست مطالب

۵۱	بخش ششم: شناوری
۵۳	تمرین‌های بخش ششم
۵۴	بخش هفتم: اصل برنولی
۵۶	تمرین‌های بخش هفتم
۵۸	مسائل تکمیلی
۶۱	مسائل امتحانی بارم‌بندی شده

## فصل سوم: کار، انرژی و توان

۶۸	بخش اول: انرژی جنبشی
۷۰	تمرین‌های بخش اول
۷۲	بخش دوم: کار
۷۷	تمرین‌های بخش دوم
۸۰	بخش سوم: قضیه کار - انرژی جنبشی
۸۴	تمرین‌های بخش سوم
۸۷	بخش چهارم: کار و انرژی پتانسیل
۸۹	تمرین‌های بخش چهارم
۹۰	بخش پنجم: پایستگی انرژی مکانیکی
۹۵	تمرین‌های بخش پنجم
۹۸	بخش ششم: کار و انرژی درونی - قانون پایستگی انرژی
۱۰۳	تمرین‌های بخش ششم
۱۰۵	بخش هفتم: توان و بازده
۱۰۹	تمرین‌های بخش هفتم
۱۱۱	مسائل تکمیلی
۱۱۳	مسائل امتحانی بارم‌بندی شده

## فصل اول: فیزیک و اندازه‌گیری

۲	بخش اول: کمیت‌ها - یکاهای
۵	تمرین‌های بخش اول
۷	بخش دوم: تبدیل یکای
۱۱	تمرین‌های بخش دوم
۱۴	بخش سوم: اندازه‌گیری
۱۵	تمرین‌های بخش سوم
۱۷	بخش چهارم: چگالی
۲۰	تمرین‌های بخش چهارم
۲۴	مسائل تکمیلی
۲۶	مسائل امتحانی بارم‌بندی شده

## فصل دوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد

۳۰	بخش اول: ویژگی‌های ماده - مفاهیم اولیه
۳۱	تمرین‌های بخش اول
۳۳	بخش دوم: فشار شاره‌ها
۳۷	تمرین‌های بخش دوم
۳۹	بخش سوم: لوله‌های U شکل
۴۰	تمرین‌های بخش سوم
۴۱	بخش چهارم: فشار هوای بارومتر
۴۴	تمرین‌های بخش چهارم
۴۶	بخش پنجم: فشارسنج شاره‌ها (مانومتر)
۴۹	تمرین‌های بخش پنجم

## فصل چهارم: دما و گرما

۲۰۹	بخش پنجم: ماشین گرمایی - یخچال
۲۱۵	تمرین‌های بخش پنجم
۲۱۸	مسائل تکمیلی
۲۲۰	مسائل امتحانی بارم‌بندی شده
<b>آزمایش‌های کتاب درسی</b>	
۲۲۴	آزمایش‌های فصل ۱، ۲ و ۴
۲۲۵	آزمایش فصل ۵
<b>آزمون‌های نوبت اول</b>	
۲۲۶	آزمون ۱
۲۲۸	آزمون ۲
۲۳۰	آزمون ۳
<b>آزمون‌های جامع</b>	
۲۳۲	آزمون ۱
۲۳۴	آزمون ۲
۲۳۶	آزمون ۳
<b>فصل ششم: پاسخ‌های تشریحی</b>	
۲۴۰	پاسخ‌های تشریحی فصل اول
۲۵۶	پاسخ‌های تشریحی فصل دوم
۲۷۴	پاسخ‌های تشریحی فصل سوم
۳۰۵	پاسخ‌های تشریحی فصل چهارم
۳۳۲	پاسخ‌های تشریحی فصل پنجم
۳۵۴	پاسخ‌های تشریحی آزمایش‌های کتاب درسی
۳۵۷	پاسخ‌های تشریحی آزمون ۱ (نوبت اول)
۳۵۷	پاسخ‌های تشریحی آزمون ۲ (نوبت اول)
۳۵۹	پاسخ‌های تشریحی آزمون ۳ (نوبت اول)
۳۶۱	پاسخ‌های تشریحی آزمون جامع ۱
۳۶۲	پاسخ‌های تشریحی آزمون جامع ۲
۳۶۳	پاسخ‌های تشریحی آزمون جامع ۳
۱۱۸	بخش اول: دما و دما‌سنجی
۱۲۰	تمرین‌های بخش اول
۱۲۲	بخش دوم: انبساط گرمایی
۱۲۹	تمرین‌های بخش دوم
۱۳۴	بخش سوم: گرما
۱۳۷	تمرین‌های بخش سوم
۱۴۰	بخش چهارم: دمای تعادل
۱۴۳	تمرین‌های بخش چهارم
۱۴۴	بخش پنجم: تغییر حالت‌های ماده
۱۵۱	تمرین‌های بخش پنجم
۱۵۴	بخش ششم: روش‌های انتقال گرما
۱۵۵	تمرین‌های بخش ششم
۱۵۷	بخش هفتم: قوانین گازها
۱۶۳	تمرین‌های بخش هفتم
۱۶۷	مسائل تکمیلی
۱۷۰	مسائل امتحانی بارم‌بندی شده

## فصل پنجم: ترمودینامیک

بخش اول: فرایندهای ترمودینامیکی - قانون اول
ترمودینامیک
تمرین‌های بخش اول
بخش دوم: فرایندهای هم‌حجم و هم‌فشار
تمرین‌های بخش دوم
بخش سوم: فرایندهای هم‌دما و بی‌دررو - فرایندهای غیرخصوصی و ترکیب فرایندها
تمرین‌های بخش سوم
بخش چهارم: چرخه ترمودینامیکی
تمرین‌های بخش چهارم

۷۱ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- الف) اگر بر سطح یک شیشه دوداندود چند قطره آب بزیم، آب به چه صورت بر این سطح قرار می‌گیرد؟ علت را توضیح دهید.
- ب) علت آن که درون لوله مویین، سطح آب فرو رفته و درون لوله مویین سطح جیوه برآمده است، چیست؟
- پ) معمولاً دیواره‌های کنار بالچه‌ها مرتبط است، علت را بیان کنید.
- ت) عامل بالا رفتن نفت از فیلله چرا غنیمتی چیست؟



۷۲ یک مایع روی سطح جامدی ریخته‌ایم. در هر حالت نحوه قرارگیری مایع روی سطح را نشان دهید.

- الف) نیروی همچسبی بین مولکول‌های مایع بیشتر از نیروی دگرچسبی بین مایع و سطح باشد.
- ب) نیروی همچسبی بین مولکول‌های مایع کمتر از نیروی دگرچسبی بین مایع و سطح باشد.

۷۳ در هر یک از پدیده‌های زیر علت پخش‌شدن مایع چیست؟

- الف) پخش‌شدن نفت در سطح آب دریا
- ب) پخش‌شدن آب روی سطح تمیز شیشه
- پ) پخش‌شدن جوهر در آب

۷۴ الف) نحوه قرارگیری آب در لوله‌های مویین شکل زیر را به صورت تقریبی نشان دهید.



ب) نحوه قرارگیری جیوه در لوله‌های مویین شکل زیر را به صورت تقریبی نشان دهید.



(الف) (ب)

۷۵ شکل‌های (الف) و (ب) نحوه قرارگیری دو مایع درون لوله شیشه‌ای را نشان می‌دهد. نیروی همچسبی مایع و نیروی دگرچسبی مایع با شیشه را در هر شکل با هم مقایسه کنید.

## بخش دوم: فشار شاره‌ها

صفحة ۳۲ تا ۳۶ کتاب درسی

$$\text{تعريف} \quad \text{فشار برابر است با نسبت اندازه نیروی عمودی وارد بر سطح به مساحت سطح} \quad P = \frac{F}{A} \quad \begin{matrix} \text{نیوتون} \\ \text{متر مربع} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \leftrightarrow \\ \text{پاسکال} \end{matrix}$$

هر پاسکال برابر  $1 \text{ N/m}^2$  است.

### خطه خط کتاب


با وجود اینکه شاره به عنوان کل ساکن است مولکول‌های آن در حال حرکت‌اند.

نیرویی که توسط شاره به دیواره داخلی ظرف یا به جسم درون شاره وارد می‌شود به دلیل این حرکت‌ها و نیروی تماسی بین مولکولی است.


برای گازهای رقیق، به علت اینکه فاصله متوسط بین مولکول‌ها زیاد است، تقریباً تمام این نیرو ناشی از برخورد مولکول‌های گاز است.

### عکس و مکث کتاب

الف) برخورد مولکول‌های هوای درون لاستیک به (ب) به هر نقطه از سطح جسم غوطه‌ور در شاره (ب) برای سادگی تنها نیروهای وارد بر دو سطح داخلی آن سبب ایجاد نیروی عمودی می‌شود. (آب) نیرویی عمودی وارد می‌شود.



(ب)



(ب)



(الف)

## • تیپ ۲ - ۱: به دست آوردن فشار از نیرو

## // ۱ مسئله //:



غواصی که مساحت عینک او  $180 \text{ cm}^2$  است، در زیر آب در حال غواصی بوده و فشار آب در محل عینک او  $2 \times 10^5 \text{ Pa}$  است. نیروی که توسط آب بر عینک غواص وارد می‌شود چند نیوتن است؟

$$A = 180 \text{ cm}^2 \times \frac{1 \text{ m}^2}{100 \text{ cm}^2} \Rightarrow A = 180 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

**راه حل** ابتدا باید مساحت عینک را برحسب مترمربع بنویسیم:

به کمک تعریف فشار نیروی وارد بر عینک توسط آب را حساب می‌کنیم:


$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow 2 \times 10^5 = \frac{F}{180 \times 10^{-4}} \xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} F = 2 \times 10^5 \times 180 \times 10^{-4} \Rightarrow F = 360 \times 10 = 3600 \text{ N}$$

$$P = \rho gh$$

(kg / m<sup>3</sup>)

عمق مایع (m)

چگالی مایع




این قسمت عمق A نیست. این قسمت عمق B نیست.

## • رابطه فشار شاره‌ها برحسب عمق شاره

- در رابطه فشار شاره، h عمق مایع یعنی فاصله قائم هر نقطه درون مایع تا سطح آزاد مایع است. به طور مثال در شکل روبرو عمق نقطه A،  $h_A$  و عمق نقطه B،  $h_B$  است.

## • عکس و مکث کتاب

برای هر دو شاره ساکن فشار از رابطه  $P = \rho gh$  به دست می‌آید اما چون چگالی گازها خیلی کم است، اختلاف فشار بین دو نقطه در محفظه گاز ناچیز است:



$$\left\{ \begin{array}{l} P_B > P_A \\ P_{A'} \approx P_{B'} \end{array} \right.$$

## • تیپ ۲ - ۲: فشار حاصل از مایع


## // ۲ مسئله //:

در یک ظرف تا ارتفاع  $30 \text{ cm}$  مایعی به چگالی  $4 \text{ g/cm}^3$  ریخته شده است. در نقطه A واقع در ارتفاع  $10 \text{ cm}$  از کف ظرف فشار را باید.

**راه حل** تمام یکاهای را باید به یکای SI تبدیل کنیم تا فشار برحسب پاسکال به دست آید.

$$\rho = 4 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \Rightarrow \rho = 4000 \text{ kg/m}^3$$

برای تبدیل  $\text{kg/m}^3$  به  $\text{g/cm}^3$  کافی است آن را در عدد ۱۰۰۰ ضرب کرد.




$$h_A = 30 - 10 = 20 \text{ cm} \Rightarrow h = \frac{20}{100} = 0.2 \text{ m}$$

$$P = \rho gh \Rightarrow P = 4000 \times 10 \times 0.2 \Rightarrow P = 8000 \text{ Pa}$$

عمق نقطه A از سطح آزاد مایع برابر است با:

فشار مایع در نقطه A را حساب می‌کنیم:



لوله باریکی مطابق شکل، بالای بشکه‌ای وصل شده است. این ظرف تا سر لوله پر از آب است. فشار حاصل از مایع را در A (سر بشکه) و B (ته بشکه) به دست آورید. (فشار جو را در نظر نگیرید و  $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$  آب)

**راه حل نکته** فشار مایع به چگالی و عمق مایع بستگی دارد و شکل ظرف و مساحت کف آن در فشار مایع بی‌تأثیر است.

چگالی آب را برحسب  $\text{kg/m}^3$  می‌نویسیم:

با توجه به رابطه فشار برای مایع، فشار در نقطه A و B را به دست می‌آوریم:

$$P_A = \rho gh_A = 1 \times 10^3 \times 10 \times \frac{1}{10} = 4 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$P_B = \rho gh_B = 1 \times 10^3 \times 10 \times \frac{2}{10} = 24 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$P = P_0 + \rho gh$$

## • مجموع فشار هوا و فشار مایع

## • خطبه خط کتاب

$P_0 = 1 \text{ atm} \approx 10^5 \text{ Pa}$ : فشار هوا محیط است. فشار هوا در سطح دریای آزاد حدود  $10135 \times 10^5 \text{ Pa}$  (atm) گویند.

این رابطه نشان می‌دهد فشار در عمق h از سطح شاره، به اندازه  $\rho gh$  از فشار  $P_0$  در سطح شاره بیشتر است.

## • تیپ ۲ - ۳: فشار کل مایع

## ﴿ ۴ ﴿ مسئله ﴿ :

چگالی آب دریاچه‌ای  $1200 \text{ kg/m}^3$  است. درجه عمقی از سطح آب دریاچه، فشار کل برابر ۷ اتمسفر است؟ ( $g = 10 \text{ m/s}^2, P_0 = 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$ )

$$P = \gamma atm \Rightarrow P = 7 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow 7 \times 10^5 = 10^5 + 1200 \times 10 \times h \Rightarrow 6 \times 10^5 = 12 \times 10^3 \times h \Rightarrow h = 50 \text{ m}$$

## • تیپ ۲ - ۴: نیروی حاصل از فشار مایع در عمق

## ﴿ ۵ ﴿ مسئله ﴿ :

در عمق ۲ متری آب دریاچه‌ای در بدنه یک قایق تغیری، یک سوراخ به مساحت  $3 \text{ cm}^2$  ایجاد شده است. برای جلوگیری از نفوذ آب به درون قایق

$$\text{چه نیرویی بر سطح سوراخ باید اعمال گردد؟} \quad (g = 10 \text{ m/s}^2, \rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3)$$

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \xrightarrow{P = \rho gh} F = \rho ghA$$

﴾ راه حل ۴ نکته ﴿ با توجه به تعریف فشار و فشار مایع می‌توان نوشت:

چگالی و مساحت را بر حسب یکای SI باید بنویسیم تا نیرو بر حسب نیوتون به دست بیاید.

$$\rho = 1 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \Rightarrow \rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$A = 3 \text{ cm}^2 \times \frac{1 \text{ m}^2}{10^4 \text{ cm}^2} \Rightarrow A = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

تبدیل به  $\text{m}^2$  به  $\text{cm}^2$

$$F = \rho ghA \Rightarrow F = 1000 \times 10 \times 2 \times 3 \times 10^{-4} \Rightarrow F = 6 \text{ N}$$


اکنون نیرو را به دست می‌آوریم:

## • تیپ ۲ - ۵: اختلاف فشار در دو نقطه از یک مایع ساکن

## ﴿ ۶ ﴿ مسئله ﴿ :


مایعی به چگالی  $1 \text{ kg/L}$  درون ظرف شکل رویه را ریخته شده است. اختلاف فشار بین نقاط M و N را باید.

$$(g = 10 \text{ N/kg})$$



ماخی به چگالی  $1 \text{ kg/L}$  درون ظرف شکل رویه را ریخته شده است. اختلاف فشار بین نقاط M و N را باید.

$$(g = 10 \text{ N/kg})$$




﴾ راه حل ۵ نکته ﴿ اختلاف فشار دو نقطه از مایع به اختلاف فاصله قائم آنها از هم بستگی دارد.

$$\Delta P_{AB} = P_B - P_A = \rho gh_B - \rho gh_A \Rightarrow \Delta P_{AB} = \rho g(h_B - h_A) \Rightarrow \Delta P_{AB} = \rho g \Delta h_{AB}$$

ابتدا اختلاف عمق نقاط M و N را از روی شکل بر حسب متر

به دست می‌آوریم.

$$\Delta h = 45 - 10 - 5 \Rightarrow \Delta h_{MN} = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$$



$$\rho = 1 \text{ kg/L} \times \frac{1 \text{ m}}{1 \text{ m}^3} \Rightarrow \rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

تبدیل لیتر به  $\text{m}^3$

$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow \Delta P_{MN} = 1000 \times 10 \times 0.3 \Rightarrow \Delta P_{MN} = 3000 \text{ Pa}$$

اختلاف فشار را حساب می‌کنیم:

## • تیپ ۲ - ۶: حل مسئله با استفاده از وزن مایع

## ﴿ ۷ ﴿ مسئله ﴿ :

مقدار  $3 \text{ kg}$  روغن در یک قابلمه قرار دارد و مساحت کف قابلمه  $1200 \text{ cm}^2$  است، فشار وارد بر کف قابلمه چند پاسکال است؟ ( $g = 10 \text{ N/kg}$ )

﴾ راه حل ۶ نکته ﴿ در حل بعضی از مسائل فشار مایع، که مایع در ظرف استوانه‌ای یا مکعبی شکل قرار دارد یعنی در ظرفی که

$$P = \frac{F}{A} \xrightarrow{F=W} P = \frac{mg}{A}$$


سطح مقطع آن در هر ارتفاعی یکسان است، می‌توان از وزن مایع استفاده کرد.

در این مسئله روغن درون قابلمه ریخته شده است و فشار وارد بر کف خواسته شده است، این فشار ناشی از وزن مایع است.

دقت کنید که ارتفاع مایع و چگالی آن داده نشده است پس بهتر است فشار را به صورت زیر به دست آورد:

$$P = \frac{mg}{A} = \frac{3 \times 10}{1200 \times 10^4} \xrightarrow{\text{تبدیل به } \text{m}^2} P = \frac{30 \times 10^4}{1200} \Rightarrow P = \frac{3000}{12} \Rightarrow P = 250 \text{ Pa}$$

## ۸ / مسئله



در شکل رویه رو ظرف تا ارتفاع  $h$  از آب پر شده است و سطح مقطع ظرف در سه قسمت از بالا به پایین به ترتیب  $2\text{ cm}$  و  $2\text{ cm}$  و  $8\text{ cm}$  است. اگر ۲ لیتر آب به آب ظرف اضافه کنیم، فشار در کف ظرف چند پاسکال افزایش می‌یابد؟  
 $(g=10\text{ N/kg}, \rho_{\text{آب}}=1000\text{ kg/m}^3)$

**راه حل نکته** در کتاب علوم نهم اصل پاسکال به صورت زیر بیان شده است:

اصل پاسکال: هر تغییری در فشار وارد بر هر شاره تراکم‌ناپذیر و محبوس بدون کاهش به تمام قسمت‌های شاره و دیوارهای ظرف منتقل می‌شود.

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow 1000 = \frac{m}{2 \times 10^{-3}} \Rightarrow m = 2 \text{ kg} \quad W = mg \Rightarrow W = 2 \times 10 \Rightarrow W = 20 \text{ N}$$

تبديل به  $\text{m}^3$

$$P = \frac{W}{A} \Rightarrow P = \frac{20}{0.04} \Rightarrow P = 500 \text{ Pa} \quad \text{این آب در دهانه ظرف با مساحت } 0.04 \text{ m}^2 \text{ ریخته شده است و فشاری برابر مقدار زیر ایجاد می‌کند:}$$


طبق اصل پاسکال این فشار به تمام نقاط مایع از جمله کف ظرف وارد شده و فشار وارد بر کف ظرف  $500 \text{ Pa}$  افزایش می‌یابد.

برای حل این مسئله نیز می‌توان از روش دیگری استفاده کرد. در این روش، افزایش ارتفاع آب پس از افزودن  $2L$  آب را حساب می‌کنیم.

$$\Delta V = A\Delta h \Rightarrow 2 \times 10^{-3} = 0.04 \Delta h \Rightarrow \Delta h = 0.05 \text{ m}$$


$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow \Delta P = 1000 \times 10 \times 0.05 = 500 \text{ Pa} \quad \text{افزایش فشار خواهد شد:}$$

## • تیپ ۲ - ۷: ظروف مرتبط



در ظروف مرتبط که محتوی یک مایع معینی هستند، مایع در ظرف‌ها هم‌سطح است. علت آن نیز وابستگی فشار مایع به عمق مایع است و این که شکل ظرف در فشار مایع ثابتی ندارد.

- در تمام ظرف‌های محتوی مایع، سطح مایع درون ظرف افقی قرار می‌گیرد.



در شکل رویه رومایعی به چگالی  $2000 \text{ g/L}$  در دو ظرف مرتبط با هم ریخته شده است. فشار در نقطه A چقدر است؟ در نقطه B چطور؟  
 $(P_0 = 10^5 \text{ Pa}, g = 10 \text{ N/kg})$

فشار در نقطه A مجموع فشار هوا و فشار مایع به ارتفاع  $20 \text{ cm}$  است. یکای چگالی را به SI تبدیل می‌کنیم:

$$\rho = 2000 \frac{\text{g}}{\text{L}} \times \frac{1\text{kg}}{10^3 \text{ g}} \times \frac{1\text{m}}{1\text{m}^3} \Rightarrow \rho = 2000 \text{ kg/m}^3$$


$$P = \rho gh_A \Rightarrow P_A = 2000 \times 10 \times 0.2 \Rightarrow P_A = 4000 \text{ Pa}$$

**نکته** در ظروف مرتبط محتوی یک مایع ساکن فشار در تمام نقاط هم‌عمق با هم برابر است.

$$P_B = P_A = 4000 \text{ Pa}$$


عمق نقطه B و عمق نقطه A یکسان است، بنابراین فشار در نقطه B خواهد شد:

## • تیپ ۲ - ۸: فشار حاصل از دو یا چند مایع



در شکل رویه رومایع دو مایع با چگالی‌های  $900 \text{ kg/m}^3$  و  $800 \text{ kg/m}^3$  درون ظرف استوانه‌ای شکلی ریخته شده‌اند.

(الف) فشار در کف ظرف چقدر است؟ (ب) فشار حاصل از دو مایع در نقطه A را بیابید.  
 $(P_0 = 10^5 \text{ Pa}, g = 10 \text{ N/kg})$




**راه حل نکته** هرگاه چند مایع مخلوط‌نشدنی درون ظرفی ریخته می‌شود، مایع‌ها به ترتیب چگالی روی هم قرار می‌گیرند

و مایع دارای بیشترین چگالی تهنه‌شین می‌شود و مایع دارای کمترین چگالی روی سطح قرار می‌گیرد.  
 $P_A > P_B > P_C$

فشار حاصل از چند مایع درون ظرف مجموع فشار تک تک مایع‌ها است.

(الف) مایعی که تهنه‌شین شده دارای چگالی  $900 \text{ kg/m}^3$  است. فشار در کف ظرف را حساب می‌کنیم:

$$P_{\text{کل}} = P_0 + P_1 + P_2 \Rightarrow P = P_0 + \rho_1 gh_1 + \rho_2 gh_2 \Rightarrow P = 10^5 + 900 \times 10 \times 0.3 + 800 \times 10 \times 0.2 \Rightarrow P = 10^5 + 2700 + 1600 \Rightarrow P = 104300 \text{ Pa}$$



$$P_A = \rho_1 gh_1 + \rho_2 gh_2 \Rightarrow P_A = 900 \times 10 \times 0.3 + 800 \times 10 \times 0.2 \Rightarrow P_A = 1800 + 1600 = 3400 \text{ Pa}$$

(ب) فشار ناشی از دو مایع در نقطه A:

در این بخش نمونه سوالاتی که اهمیت طرح در امتحان نهایی دارند، برای تمرین کردن تمیز و مفوب تمرین کنی.


شماره تیپ هر سوال کثیرش اومده که آنکه نتوصتی هل کنی، بتونی از درس نامه اون تیپ رو مطالعه کنی.

## تمرین‌های بخش دوم

۷۶ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.



(الف) در شکل روبرو تنید خروجی آب از قسمت‌های A و B را با هم مقایسه کنید. [شکل ۲-۱۲، صفحه ۳۳ کتاب درسی](#)




(ب) در شکل روبرو نقاط A و B در مخزن گاز و A' و B' نقاطی در یک مایع‌اند. فشار نقاط A و B را با یکدیگر و سپس فشار نقاط A' و B' را نیز با هم مقایسه کنید. [شکل ۲-۱۵، صفحه ۳۴ کتاب درسی](#)

۷۷ (الف) در عمق ۸ متری مایعی، فشار کل ۱/۱۰۰۰۰۰ پاسکال باشد. اگر فشار هوا ۱ اتمسفر است. اگر فشار هوا ۱ اتمسفر باشد، چگالی مایع را بدست آورید. ([تیپ ۲ - ۲ و ۳ - ۳ مثال ۲-۲، صفحه ۳۵ کتاب درسی](#))  
 $(g = 10 \text{ N/kg}, 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa})$

(ب) اگر فشار هوا  $10^5$  پاسکال باشد، فشار در عمق ۲ متری آب یک استخراج چند پاسکال است؟ ( $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$ )

۷۸ (الف) در شکل روبرو فشار در نقاط A و B را حساب کنید. ( $P_{\text{آب}} = 10^5 \text{ Pa}, g = 10 \text{ N/kg}, \rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$ ) [مثال ۲-۲، صفحه ۳۵ کتاب درسی](#)

(ب) همچنین فشار حاصل از آب را در نقاط A و B به دست آورید. ([تیپ ۲ - ۲ و ۳ - ۳](#))  
(پ) فشار در نقاط A و C را با هم مقایسه کنید.




۷۹ در عمق ۵ cm مایعی فشار  $100 \text{ kPa}$  و در عمق ۲۰ cm آن فشار  $106 \text{ kPa}$  است: ([تیپ ۲ - ۲ و ۳ - ۳](#))

(الف) چگالی مایع را بدست آورید.

(ب) فشار هوای محیط را حساب کنید.

۸۰ در سه ظرف نشان داده شده آب ریخته شده است. در کدامیک از ظرف‌ها نیروی وارد از طرف آب بر دیواره ظرف عمود است? ([تیپ ۲ - ۱ - ۱](#))



۸۱ (الف) هواییابی در ارتفاعی از سطح زمین در حال پرواز است. فشار هوا در این ارتفاع  $70 \text{ kPa}$  است. اگر پنجرهای هواییما دایره‌های با قطر  $40 \text{ cm}$  باشد، نیروی وارد بر سطح خارجی این پنجرهای چند نیوتون است؟ ( $\pi \approx 3$ ) ([تیپ ۲ - ۱ و ۴ - ۴ مثال ۲-۱، صفحه ۳۶ کتاب درسی](#))

(ب) شناگری در عمق ۵ متری از سطح آب دریاچه‌ای شنا می‌کند. اگر مساحت پرده گوش را یک سانتی‌متر مربع فرض کنیم، بزرگی نیرویی که به پرده گوش این شناگر وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ (فسار هوا را  $10^5$  پاسکال بگیرید و  $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$ ) [مثال ۲-۱، صفحه ۳۶ کتاب درسی](#)


(پ) یک زیردریابی در عمق  $200$  متری زیر آب غوطه‌ور است. بالای این زیردریابی دریچه‌ای مربعی به ابعاد  $8 \times 8 \text{ cm}$  نصب شده است. برای بازگردان این دریچه حداقل چند نیوتون نیرو لازم است؟ ( $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$ ) [مثال ۲-۱، صفحه ۳۳ کتاب درسی](#)

۸۲ در یک لوله استوانه‌ای قائم تا ارتفاع  $10 \text{ cm}$  مایعی به چگالی  $2 \text{ g/cm}^3$  می‌ریزیم. قطر داخلی لوله  $4 \text{ cm}$  است. (الف) فشار وارد بر کف استوانه را حساب کنید. ( $P_{\text{آب}} = 10^5 \text{ Pa}, g = 10 \text{ N/kg}$ ) ([تیپ ۲ - ۶](#))

(ب) فشار حاصل از مایع در کف استوانه را حساب کنید.

(پ) نیروی وارد از طرف مایع بر کف لوله را بدست آورید.


(ت) نیروی وارد بر کف لوله را بدست آورید.




۸۳ در شکل زیر، مایع درون لوله‌های مرتبط در حال تعادل است. الف) فشار در نقاط A, B, C, D را با هم مقایسه کنید. (تیپ ۲ - ۵ و ۷ - ۴، صفحه ۳۴)

ب) فشار حاصل از مایع در نقطه D چقدر است؟ ( $g = 10 \text{ N/kg}$ )

پ) اگر مساحت مقطع شاخه سمت راست برابر  $10 \text{ cm}^2$  باشد، نیروی وارد به انتهای این شاخه چند نیوتون است؟



ت) در ظرف حاوی آب (شکل مقابل) اگر قطعه چوب را روی سطح آب قرار دهیم فشار در نقطه A به اندازه  $\Delta P_A$  و در نقطه B به اندازه  $\Delta P_B$  افزایش می‌یابد.  $\Delta P_A$  و  $\Delta P_B$  را با هم مقایسه کنید.



الف) در شکل زیر جسم درون مایعی غوطه‌ور است. اگر فشار در بالا و زیر جسم به ترتیب  $100 \text{ kPa}$  و  $115 \text{ kPa}$  باشد، چگالی شاره را بدست آورید. (تیپ ۲ - ۵)

ب) استوانه‌ای توپر که شعاع قاعده آن  $20 \text{ cm}$  است، مطابق شکل درون آب به چگالی  $1000 \text{ kg/m}^3$  غوطه‌ور است. اختلاف نیرویی که از طرف آب به قاعده‌های پایین و بالای استوانه وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ ( $\pi \approx 3.14$ )

تمرین ۲ - ۲، صفحه ۳۶ کتاب درسی

۸۴ در سؤالات زیر نسبت‌های خواسته شده را بدست آورید. (تیپ ۲ - ۲ و ۴ - ۲)


الف) دو ظرف مشابه A و B در اختیار داریم. در هر دو ظرف تا ارتفاع یکسان مایع می‌ریزیم. مایع ریخته شده در ظرف A دارای چگالی  $800 \text{ kg/m}^3$  و مایع ریخته شده در ظرف B دارای چگالی  $1000 \text{ kg/m}^3$  است. نسبت فشار مایع در کف ظرف A به فشار مایع در کف ظرف B را بیابید.

ب) دو ظرف مکعب شکل A و B در اختیار داریم که ابعاد ظرف A دو برابر ابعاد ظرف B است. اگر هر دو ظرف را از مایع یکسانی پر کنیم، فشار مایع در کف ظرف A چند برابر فشار مایع در کف ظرف B است؟

پ) ظرف مکعب‌شکل A پر از مایع بوده و فشار در کف ظرف برابر  $P_A$  است. اگر تمام مایع را در ظرف مکعب‌شکل B بریزیم که ابعاد آن

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{800}{1000} = 0.8$$


ت) در قسمت‌های (ب) و (پ) نسبت نیروی وارد از طرف مایع بر کف ظرفها را حساب کنید.



۸۵ شکل زیر، نمودار فشار بر حسب عمق مایع ( $h$ ) را نشان می‌دهد.

الف) چگالی مایع را حساب کنید. ( $g = 10 \text{ N/kg}$ )


ب) فشار حاصل از مایع در عمق  $1 \text{ m}$  را بیابید.



۸۶ در ظرف‌های شکل رویه‌رو مقداری آب ریخته شده است. (تیپ ۲ - ۴)

الف) فشار در کف ظرفها را با هم مقایسه کنید.

ب) نیروی وارد بر کف ظرفها توسط مایع را با هم مقایسه کنید.



۸۷ در شکل‌های زیر در ظرف‌ها مایعی به چگالی  $1000 \text{ kg/m}^3$  ریخته شده است.

الف) فشار در کف ظرفها را با هم مقایسه کنید.

ب) نیروی وارد بر کف ظرفها توسط مایع را با هم مقایسه کنید.


۸۸ در شکل‌های زیر در ظرف‌ها مایعی به چگالی  $1000 \text{ kg/m}^3$  ریخته شده است.

نیرویی که مایع بر کف ظرف وارد می‌کند چند نیوتون است؟ ( $g = 10 \text{ N/kg}$ )


(تیپ ۲ - ۴)

در این قسمت، برای مکالمه کاری سوالاتی که کمی سطح بالاتری از آزمون نهایی دارند، آورده‌یم؛ اگه فکر می‌کنی که سوالات بخش‌های قبلی رو کامل بلدی و دنبال سوال سفت‌تر هستی، هنماً این قسمت رو هم کن.

### مسائل تکمیلی




- ۱ در یک استخیر مطابق شکل روبرو مقداری مایع وجود دارد. اگر فشار در نقطه A برابر  $\frac{4}{4} \text{ atm}$  و در نقطه B برابر  $\frac{4}{4} \text{ atm}$  باشد، فشار در نقطه C چند اتمسفر است؟




- ۲ مطابق شکل روبرو دو جسم مکعبی شکل که طول اضلاع آنها  $a$  و  $2a$  است، در دو ظرف حاوی مایع به چگالی‌های  $\rho_1$  و  $\rho_2$  غوطه‌ور و در حال تعادل هستند. اگر اختلاف فشار بین سطح پایین و سطح بالایی مکعب‌ها در دو مایع با هم برابر باشد،  $\rho_1 / \rho_2$  را به دست آورید.

- ۳ در یک لوله آزمایش تا ارتفاع ۲۸ سانتی‌متر به جرم‌های مساوی جیوه و آب ریخته‌ایم. فشار وارد بر کف ظرف از طرف دو مایع چند کیلوپاسکال است؟ ( $\rho_{H_2O} = 1g/cm^3$ ,  $\rho_{Ji} = 13g/cm^3$ )




- ۴ در شکل روبرو اگر  $L/2$  آب به درون ظرف بریزیم ( $A_2 = 125cm^2$ ,  $A_1 = 50cm^2$ ,  $\rho_{آب} = 1g/cm^3$ )  
الف) فشار وارد بر کف از طرف آب چند پاسکال است?  
ب) نیروی وارد بر کف ظرف چند نیوتون است؟




- ۵ در شکل روبرو ظرفی محتوی آب نشان داده شده است:  
( $\rho = 1g/cm^3$ ,  $g = 10N/kg$ )


- الف) فشار وارد بر کف ظرف توسط مایع را بیابید.  
ب) اگر فشار هوای محیط ۱ bar باشد، فشار کل وارد بر کف ظرف را بیابید.  
پ) نیروی وارد از طرف مایع بر ته ظرف را بیابید  
ت) نیروی کل وارد بر ته ظرف را بیابید؟




- ۶ در شکل داده شده حجم و عمق آب در هر دو ظرف مشابه‌اند.  
الف) فشار وارد بر کف ظرف‌ها از طرف آب را با هم مقایسه کنید.  
ب) نیروهای وارد بر کف ظرف از طرف آب را با هم مقایسه کنید.  
پ) نیروی وارد بر سطح افقی که ظرف‌ها روی آن قرار دارند از طرف دو ظرف را با هم مقایسه کنید.




- ۷ در شکل روبرو، آب یک مخزن توسط شیلنگی به سطح مقطع  $5cm^2$  بیرون می‌ریزد. اگر ته شیلنگ توسط چوب‌پنه بسته شود و جریان آب قطع گردد، نیروی اصطکاک بین چوب‌پنه و شیلنگ چند نیوتون است؟ ( $P_0 = 10^5 Pa$ ,  $g = 10N/kg$ ,  $\rho_{آب} = 1g/cm^3$ )




- ۸ در شکل روبرو دو مایع با چگالی‌های  $1/2 g/cm^3$  و  $9 g/cm^3$  در یک لوله U شکل قرار دارند. اختلاف فشار بین دو نقطه A و B چند پاسکال است؟




- ۹ در شکل روبرو، قطر قاعده دو استوانه با هم برابر و قطر لوله رابط ناچیز است. اگر شیر ارتباط را باز کنیم، سطح مایع A چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟ ( $\rho_A = 2\rho_B$ )




- ۱۰ شکل روبرو چگالی هوا در ارتفاع‌های مختلف را نشان می‌دهد. اگر اختلاف فشار هوا از سطح زمین تا ۵ km سطح زمین را  $\Delta P_1$  و از ۵ km سطح زمین تا ۱۰ km سطح زمین را  $\Delta P_2$  بگیریم،  $\Delta P_1$  و  $\Delta P_2$  را با هم مقایسه کنید.



- ۱۱ در شکل روبرو لوله به وسیلهٔ نیروی  $F = 27\text{ N}$  در نقطه A در حالت تعادل باقی مانده است. فشار هوا محیط چند سانتی‌متر جیوه است؟ (مساحت سطح لوله  $5\text{ cm}^2$  و  $\rho = 13/5\text{ g/cm}^3$  مایع جیوه است.)




- ۱۲ در شکل روبرو بالای لوله A تقریباً خلاً است.  
الف) فشار در انتهای لوله B چند سانتی‌متر جیوه و چند پاسکال است؟ ( $\rho_{جیوه} = 13/6\text{ g/cm}^3$ )  
ب) اگر سطح مقطع لوله‌ها  $5\text{ cm}^2$  باشد، نیروی وارد بر انتهای لوله B چند نیوتون است؟



- ۱۳ در شکل مقابل اگر فشار مخزن A  $84\text{ cmHg}$  باشد، فشار در نقطه M چند سانتی‌متر جیوه است؟ ( $\rho_{جیوه} = 13/6\text{ g/cm}^3$ ,  $\rho_{Hg} = 13/8\text{ g/cm}^3$ )



- ۱۴ در شکل روبرو، چگالی مایع درون لوله  $\rho = 12\text{ g/cm}^3$  و فشار گاز درون مخزن  $10^4\text{ Pa}$  است، اگر مخزن سوراخ شود. مایع در شاخه سمت چپ چند سانتی‌متر پایین می‌رود؟ ( $P_0 = 10^5\text{ Pa}$ )









- ۱۵ در شکل روبرو، قطر شاخه A نصف قطر شاخه B است و درون لوله U شکل، جیوه قرار دارد. شاخه A را به یک مخزن گاز وصل می‌کنیم. در شاخه A جیوه ۲ cm پایین می‌رود. فشار پیمانه‌ای مخزن گاز چند سانتی‌متر جیوه است؟

## مسائل امتحانی بارمبندی شده

این قسمت پنجه بمعنی بندی داره و از هر قسمت پندرتا سوال فوب آوردیم، مثل آزمون‌ها، نمره هر قسمت از هل سوال در پاسخ مشففن شده تابعی هساب کنی که په نمره‌های می‌گیری.

ردیف	حالت‌های ماده - نیروی بین مولکولی	بارم
۱	<p>به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) انواع جامدات را نام بده و برای هر کدام مثالی بزنید.</p> <p>(ب) تفاوت این جامدها چیست؟</p>	۰/۵
۲	<p>در عبارت‌های زیر کلمه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) سطح جیوه درون لوله موین (فرورفته - افقی - برآمده) است:</p> <p>(ب) آب در لوله موین روغنی شده (بالاتر - پایین‌تر) از سطح آزاد مایع درون ظرف قرار می‌گیرد.</p> <p>(پ) مولکول‌های (جامد، مایع، گاز) به سهولت روی یکدیگر می‌لغزند و جاری می‌شوند.</p> <p>(ت) قطره آب که از شیر جدا می‌شود به علت (نیروی دگرسی - کشش سطحی) در حین سقوط به صورت قطره باقی می‌ماند.</p> <p>(ث) فاصله مولکول‌ها در گازها در حدود (<math>چند\text{ }de-10^{\circ}</math>) برابر فاصله آن‌ها در مایع و جامد است.</p> <p>(ج) افزودن چند قطره مایع شوینده به آب سبب (افزایش - کاهش) کشش سطحی می‌شود.</p>	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
۳	<p>با توجه به کلمات موجود در کادر زیر عبارت‌های داده شده را کامل کنید.</p> <p>«بلورین - نسبت به - پلاسما - کندی - معدنی - فلزها - تراکم‌ناپذیری - به تنی - دمای‌های بالا - آمورف - نوسان‌های - رانشی»</p> <p>(الف) ماده درون ستارگان از ..... تشکیل شده است. این ماده اغلب در ..... بوجود می‌آید.</p> <p>(ب) در جامدها، ذرات تشکیل‌دهنده در مکان‌های معینی ..... یکدیگر قرار دارند و در اطراف این مکان‌ها، ..... بسیار کوچکی دارند.</p> <p>(پ) در جامدها ..... مثل ..... نمک، الماس و بیشتر مواد ..... اتم‌ها در یک الگوی سه بعدی تکرار می‌شوند.</p> <p>(ت) وقتی مایعی به ..... سرد شود اغلب جامد بلورین تشکیل می‌شود و چنانچه ..... سرد شود جامد ..... بوجود می‌آید.</p> <p>(ث) نیروی ..... قوی بین مولکول‌های مایع علت ..... آن است.</p>	۰/۵ ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۵
۴	<p>به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) بعضی اوقات مشاهده می‌شود که بعضی حشرات روی سطح آب ایستاده‌اند، علت را بیان کنید.</p> <p>(ب) افزایش دمای یک مایع چه تأثیری بر نیروی هم‌چسبی مولکول‌های مایع و چه تأثیری بر جاری شدن مایع دارد؟</p> <p>(پ) در زمستان خیلی از خانواده‌ها کولر آبی بالای بام منزل خود را با چادر برزنتی می‌بوشانند و با طناب آن را می‌بندند. در روزهایی که باد با سرعت می‌وزد، این چادرهای برزنتی پف می‌کنند، علت را توضیح دهید.</p>	۰/۵ ۰/۵ ۰/۵
	<b>فشار شاره</b>	
۵	<p>در ظرفی مطابق شکل، آب ریخته شده است. فشار در نقاط A، B و C را به ترتیب با <math>P_A</math>، <math>P_B</math> و <math>P_C</math> نشان می‌دهیم. فشار در نقاط A، B و C را با هم مقایسه کنید.</p>	۰/۵
۶	<p>در شکل رویه رو چگالی مایع درون ظرف <math>4g/cm^3</math> است. اختلاف فشار بین دو نقطه A و B چند کیلوپاسکال است؟</p>	۱/۵

۰/۷۵	<p>فشار وارد بر کف دریاچه‌ای (<math>\rho=1200\text{ kg/m}^3</math>, <math>g=10\text{ N/kg}</math>) ۲۴۰kPa و فشار هوا در این محل ۹۰kPa است. عمق دریاچه چند متر است؟</p>	۷
۱/۲۵	 <p>در شکل روبرو ظرفی محتوی جیوه نشان داده شده است. نیروی وارد از طرف جیوه بر کف ظرف <math>(g=10\text{ N/kg}, \rho_{جیوه}=1350\text{ kg/m}^3)</math> ۱۳۵N است. ارتفاع <math>h</math> چقدر است؟</p>	۸
۱/۲۵	 <p>دو مایع A و B با حجم‌های یکسان <math>50\text{ cm}^3</math> که چگالی آنها <math>\rho_A=12\text{ g/cm}^3</math> و <math>\rho_B=6\text{ g/cm}^3</math> است. در یک ظرف با سطح مقطع <math>10\text{ cm}^2</math> ریخته شده‌اند.</p> <p>الف) فشار وارد بر کف ظرف از طرف هر دو مایع چقدر است.</p> <p>ب) نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع‌ها را به دست بیاورید.</p>	۹
۰/۷۵	<p>الف) ظرف مکعب‌شکلی پر از مایع است. اگر ابعاد مکعب را دو برابر کرده و از همان مایع پر کنیم. فشار وارد از طرف مایع به کف ظرف نسبت به حالت قبل چند برابر می‌شود؟</p> <p>ب) نیروی وارد از طرف مایع بر کف ظرف در حالت دوم چند برابر حالت اول است؟</p>	۱۰
۱	 <p>نمودار تغییرات فشار ناشی از مایع بر حسب فاصله از کف ظرف به صورت مقابل است. در چه فاصله‌ای از کف ظرف فشار ناشی از مایع برابر با <math>2400\text{ Pa}</math> می‌شود؟</p> <p>(<math>g=10\text{ N/kg}</math>)</p>	۱۱
۱	<p>یک منبع مکعب شکل به ضلع ۲ متر پر از آب است. اگر آب درون آن را درون مخزن استوانه‌ای شکل به سطح قاعده <math>4\text{ m}^2</math> بربیزیم.</p> <p>فشار وارد بر کف استوانه چند برابر فشار آب وارد بر کف مکعب می‌شود؟</p>	۱۲
<b>لوله U شکل</b>		
۰/۵	 <p>دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی‌های <math>\rho_1=12\text{ g/cm}^3</math> و <math>\rho_2=8\text{ g/cm}^3</math> در حال تعادل هستند.</p> <p>الف) کدام مایع در قسمت زیرین ظرف قرار دارد.</p> <p>ب) <math>h_2</math> را حساب کنید.</p>	۱۳
۱/۵	 <p>در شکل روبرو مایع در لوله U شکل در حال تعادل است و پیستون با بدنه لوله اصطکاک ندارد. جرم پیستون را به دست آورید.</p> <p>(مساحت مقطع لوله <math>10\text{ cm}^2</math>, <math>g=10\text{ N/kg}</math>)</p>	۱۴
۰/۷۵ ۱/۲۵	 <p>در شکل روبرو دو مایع در حال تعادل‌اند. اگر چگالی مایع <math>\rho_1</math> برابر <math>3\text{ g/cm}^3</math> باشد:</p> <p>الف) چگالی مایع <math>\rho_2</math> را حساب کنید.</p> <p>ب) اختلاف فشار بین دو نقطه A و B را به دست آورید.</p>	۱۵
۱	 <p>در شکل روبرو، آب و روغن در یک لوله U شکل به حال تعادل‌اند. چگالی روغن چند برابر چگالی آب است؟</p>	۱۶

## پاسخ تشریحی

### فصل دوم

**۷۰** الف) کاهش / ب) هم‌چسبی - دگرچسبی - بیشتر / ب) برآمده - فرورفته

**۷۱** الف) نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و دوده بیشتر است، از این‌رو آب به صورت قطره بر سطح این شیشه قرار می‌گیرد. / ب) نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و شیشه از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب بیشتر بوده و در محل تماس آب و جداره لوله موین سبب بالا کشیده شدن آب در این محل‌ها شده و قسمت میانی آب پایین‌تر قرار می‌گیرد و سطح آب دارای فرو رفتگی می‌شود. در مورد جیوه برعکس است و نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های جیوه سبب می‌گردد سطح جیوه درون لوله برآمده باشد.



سطح جیوه در لوله موین  
سطح آب در لوله موین


پ) علت مرطوب بودن دیواره کنار باغچه، خاصیت موینگی است که سبب می‌گردد آب درون دیواره باغچه بالا رود. / ت) عامل بالا رفتن نفت از فتیله چراغ نقی خاصیت موینگی است. نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های نفت و فتیله از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های نفت بیشتر است.

**۷۲** الف) هنگامی که نیروی هم‌چسبی مایع بیشتر بکدیگر را بیشتر باشد، مولکول‌های مایع بیشتر بکدیگر را قطره آب

جذب کرده و به صورت قطره‌های روی سطح ظرف شیشه‌ای چرب شده جامد باقی می‌مانند. مانند شکل مقابل که قطرات آب روی شیشه چرب شده قرار دارند. / ب) هنگامی که نیروی دگرچسبی بیشتر است مولکول‌های مایع و سطح بیشتر بکدیگر را جذب کرده و پدیده ترشوندگی رخ می‌دهد و مایع به صورت یک لایه نازک روی سطح قرار می‌گیرد. مانند آب روی شیشه.

**۷۳** الف) به دلیل کمتر بودن چگالی نفت از آب، نفت روی سطح آب قرار می‌گیرد. / ب) نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و شیشه از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب بیشتر بوده که سبب می‌گردد آب به صورت یک لایه بر سطح شیشه پخش شود. / پ) علت پخش شدن جوهر در آب حرکت کنوره‌ای مولکول‌های آب است.

**۷۴** الف) هرجه لوله موین‌تر باشد، آب درون آن بیشتر بالا می‌رود.



ب) هرجه لوله موین‌تر باشد، فاصله جیوه درون لوله از سطح جیوه درون ظرف بیشتر است.

**۷۵** در شکل (الف) سطح در کناره‌ها که مایع باشیشه در تماس است بالاتر قرار گرفته، پس نیروی بین مایع و شیشه (دگرچسبی) از نیروی مولکول‌های مایع به هم وارد می‌کند (هم‌چسبی) بیشتر است. / در شکل (ب) سطح مایع در وسط لوله بالاتر قرار گرفته است. پس نیروی بین مایع و شیشه (دگرچسبی) در کناره‌های لوله کمتر از نیروی بین مولکول‌های مایع (هم‌چسبی) در مرکز لوله می‌باشد.

**۷۶** الف) عمق مایع در نقطه A از عمق مایع در نقطه B بیشتر است در نتیجه فشار مایع در سوراخ A از فشار مایع در سوراخ B بیشتر بوده که سبب می‌گردد تندی خروجی آب در A بیشتر از B باشد.

پ) در یک مخزن گاز فشار در تمام نقاط گاز یکسان است:  
 $P_A = P_B$   
در یک مایع ساکن فشار در نقاط عمیق‌تر بیشتر است:  
 $P_B > P_{A'}$

**۶۲** الف) نادرست. وقتی مایع را متراکم می‌کنیم، نیروی بین مولکولی به صورت نیروی رانشی ظاهر شده و مانع تراکم مایع می‌شود. / ب) نادرست. نیروی هم‌چسبی مولکول‌های آب مانع فرورفت سوزن در آب می‌شود. / پ) نادرست / ت) درست / ث) درست / ج) درست

**۶۳** الف) جامد بلورین - جامد بی‌شكل (یا آمورف) / ب) پلاسما / پ) سه بعدی - جامد بلورین / ت) پلاسما / ث) تقريباً - یک آنگستروم / ج) خيلي بيشتر / ج) پخش / ح) هم‌چسبی - دگرچسبی

**۶۴** شکل (الف) ساختار سه بعدی منظم و تکرارشونده‌ای دارد، از این‌رو ساختار منظمی از یک جامد بلورین را نشان می‌دهد. مانند فلزها، نمک‌ها، الماس، یخ و بیشتر مواد معدنی / شکل (ب) ساختار منظم و تکرارشونده‌ای ندارد، بنابراین این شکل یک جامد بی‌شكل (آمورف) را نشان می‌دهد مانند شیشه.


**۶۵** الف) علت آن این است که تندی حرکت کاتسورهای مولکول‌های گاز از تندی حرکت کاتسورهای مولکول‌های مایع بیشتر است. / ب) حالت چهارم ماده را پلاسما گویند که معمولاً در دمای‌های خیلی بالا به وجود می‌آید. ماده درون ستارگان، بیشتر فضای بین ستاره‌ای، آذرخش، آتش و درون لوله تابان لامپ‌های مهتابی از پلاسما تشکیل شده است. / پ) علت آن برخوردهای متوالی مولکول‌های عطر با مولکول‌های هوا است که باعث می‌شود مولکول‌های عطر در مسیر مستقیم حرکت نکرده و سبب پراکندگی مولکول‌های عطر به تمام نقاط اطراف می‌شود و در نتیجه سبب می‌گردد تا تندی حرکت مولکول‌های عطر کاهش یابد.

**۶۶** الف) نیروی جاذبه بین مولکول‌های همسان مانند مولکول‌های آب را نیروی هم‌چسبی و نیروی جاذبه بین مولکول‌های ناهمسان را نیروی دگرچسبی گویند. / ب) نیرویی که مولکول‌های شیشه را کنار هم نگه می‌دارد، نیروی جاذبه بین مولکولی است که وقتی شیشه می‌شکند و مولکول‌ها از دور می‌شوند، چنانچه قطعه‌های شیشه را به هم نزدیک کنیم به هم نمی‌جسبند زیرا نیروی بین مولکولی کوتاه بُرد است. برای چسباندن قطعات شیشه باید آن را گرم کرد تا نرم شود و مولکول‌های دو قطعه شیشه به هم نزدیک شود و نیروی بین مولکولی که کوتاه بُرد است بتواند دو قطعه را به هم چسباند. / پ) نشستن حشره روی سطح آب، تشکیل حباب‌های آب و صابون

**۶۷** هر سه شکل بیانگر کشش سطحی است. وقتی قلم مو از آب بیرون کشیده شود، کشش سطحی مولکول‌های آب سبب نزدیک شدن موهای آن به هم می‌شود. دقیقاً شبیه شکل (ب) که قطره‌های آب که از سطح رو به بالا پرتاب شده‌اند، شکل کروی دارند. در شکل (پ) هم حباب‌های آب و صابون به علت کشش سطحی به وجود آمده است.

**۶۸** الف) بین ریزگردها نیروی ریاضی محسوسی وجود ندارد به همین علت با وزش باد از هم جدا شده و در فضای پخش می‌شوند. اما نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب به اندازه‌ای است که با توفان‌های شدید دریابی تنها مقدار کمی آب به صورت قطره‌های ریز به طرف بالا می‌پاشد. / ب) مایع ظرفشویی سبب می‌گردد نیروی کشش سطحی بین مولکول‌های آب ضعیف گردد و سوزن در آب فرود. / پ) با افزایش دمای روغن نیروی هم‌چسبی کاهش می‌باید بنابراین قطرات کوچک می‌شوند بنابراین در شکلی که قطرات روغن بزرگ‌تر هستند، نیروی هم‌چسبی قوی‌تر است و دمای روغن کمتر است.

**۶۹** در شکل (الف) به دلیل کشش سطحی گیره روی سطح آب باقی مانده است. در شکل (ب) به دلیل وزن سکه نیروی رو به پائین به یک طرف کارت وارد می‌شود اما نیروی دگرچسبی بین کارت و آب مانع از جدا شدن طرف دیگر کارت از سطح آب می‌شود. / ب) علت آن، نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و ماسه است که باعث ایجاد یک پوسته کشسان در سطح ماسه خیس شده و پا کمتر در سطح ماسه خیس فرو می‌رود. / پ) کشش سطحی کاهش می‌باید و همین امر سبب می‌گردد که بتوان حباب‌های بزرگ و زیبایی ایجاد کرد.



(الف) (ب)

پ) فشار آب در عمق ۲۰۰ متری بسیار زیاد است و نیروی بزرگی را بر سطح دریچه وارد می کند که مقدار آن خواهد شد:

$$F = PA = \rho ghA \Rightarrow F = ۱۰۰۰ \times ۱۰ \times ۲۰۰ \times (۰/۸)^۲ = ۱/۲ \times ۱۰^۶ N$$

دقت کنید فشار هوا که توسط آب از بیرون دریچه به آن وارد می شود و فشار هوای درون زیردریایی که از داخل به دریچه وارد می شود تأثیر یکدیگر را از بین می بردند. از این رو در محاسبات فشار هوا را در نظر نگرفته ایم.

**۸۲** چگالی مایع را به  $kg/m^3$  تبدیل می کنیم:

$$\rho = \gamma/\gamma = \frac{g}{cm^3} \times \frac{1kg}{10^3g} \times \frac{10^6 cm^3}{m^3} = ۷۲۰۰ kg/m^3$$

الف) فشار وارد بر کف استوانه مجموع فشار هوا و فشار مایع است. از این رو:

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow P_{کل} = ۱۰^۵ + ۷۲۰۰ \times ۱۰ \times \frac{۱}{۱۰۰} \Rightarrow P_{کل} = ۱۰۷۲۰۰ Pa$$

ب) فشار ناشی از مایع در کف استوانه خواهد شد:

$$P = \rho gh \Rightarrow P = ۷۲۰۰ \times ۱۰ \times \frac{۱}{۱۰۰} \Rightarrow P = ۷۲۰۰ Pa$$

پ) مساحت کف لوله را حساب می کنیم:

$$A = \pi r^2 \Rightarrow A = ۳ \times \left( \frac{۴ \times ۱}{۲} - ۲ \right)^2 \Rightarrow A = ۳ \times ۴ \times ۱ = ۱۲ cm^2$$

تبدیل به متر

$$\Rightarrow A = ۱۲ \times ۱ = ۱۲ m^2$$

نیروی که از طرف مایع بر کف وارد می شود برابر است با:

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow F = ۷۲۰۰ \times ۱۲ \times ۱ = ۸/۶۴ N$$

ت) نیروی وارد بر کف ظرف ناشی از فشار هوا و فشار مایع خواهد شد:  
 $F = P_{کل} A \Rightarrow F = ۱۰۷۲۰۰ \times ۱۲ \times ۱ = ۱۲۸/۶۴ N$

**۸۳** الف) در ظرف مرتبط که در آن یک مایع ریخته شده است فشار در تمام نقاط هم عمق یکسان است.

ب) برای پیدا کردن مقدار فشار در نقطه D، کافی است فشار مایع در نقطه A را حساب کنیم:

$$P_D = P_A = \rho gh_A \Rightarrow P_D = ۲۰۰۰ \times ۱ \times \frac{۱}{۱۰۰} \Rightarrow P = ۳۶۰۰ Pa$$

پ) اگر انتهای شاخه سمت راست بسته نبود و طول این شاخه زیاد بود باید مایع در این لوله بالاتر می رفت بنابراین به سر انتهای بسته این لوله فشار وارد می شود که باید مقدار آن را حساب کنیم. فشار در نقطه D، برابر فشار مایع به ارتفاع ۸cm و فشار انتهای لوله است. بنابراین:

$$P_D = P_{۸cm} + P_{۸} \Rightarrow P_D = \rho gh + P_{۸}$$

$$\Rightarrow ۳۶۰۰ = ۲۰۰۰ \times ۱ \times \frac{۸}{۱۰۰} + P_{۸} \Rightarrow P_{۸} = ۲۰۰۰ Pa$$

نیروی که به انتهای لوله وارد می شود را حساب می کنیم.

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow F = ۲۰۰۰ \times ۱ \times \frac{۸}{۱۰۰} \Rightarrow F = ۲N$$

تبدیل به مترمربع

ت) وقتی قطعه چوب را بر سطح آب قرار می دهیم، فشار حاصل از وزن قطعه چوب بنا به اصل پاسکال توسط مایع به تمام نقاط مایع به طور یکسان وارد می شود و در تمام نقاط فشار به یک اندازه بالا می رود.  
 $\Delta P_A = \Delta P_B$

**۷۷** الف) فشار کل برابر مجموع فشار هوا و فشار مایع است.

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow ۱/۷۶ \times ۱۰^۵ = ۱ \times ۱۰^۵ + \rho \times ۱ \times ۸$$

$$\Rightarrow ۱/۷۶ \times ۱۰^۵ - ۱ \times ۱۰^۵ = \rho \times ۸$$

$$\Rightarrow ۷۶ \times ۱۰^۵ - ۱ \times ۱۰^۵ = \rho \times ۸ \Rightarrow \rho = \frac{۷۶ \times ۱۰^۵}{۸} = ۹۵ \times ۱۰^۴ kg/m^3$$

ب) یکای چگالی باید بر حسب  $kg/m^3$  باشد تا فشار بر حسب پاسکال به دست آید.

$$\rho = ۱ g/cm^3 \times ۱ \times ۱۰۰۰ = ۱ \times ۱۰۰۰ kg/m^3$$

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow P = ۱ \times ۱۰^۵ + ۱ \times ۱۰۰ \times ۱ \times ۲ \Rightarrow P = ۱۲ \times ۱۰۰ Pa$$


**۷۸** الف) برای به دست آوردن فشار باید عمق نقطه مورد نظر را مشخص کنیم عمق A و B برابر  $h_B = ۶m$  و  $h_A = ۱۲m$  است. بنابراین

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow \begin{cases} P_A = ۱ \times ۱۰^۵ + (۱ \times ۱\text{۰}\text{۰}\text{۰}) \times ۱ \times ۱ \times ۱ \times ۲ \Rightarrow P_A = ۲۲ \times ۱۰۰ Pa \\ \text{تبدیل یکای چگالی به } kg/m^3 \\ P_B = ۱ \times ۱۰^۵ + ۱ \times ۱\text{۰}\text{۰}\text{۰} \times ۱ \times ۱ \times ۶ \Rightarrow P_B = ۱۶ \times ۱۰۰ Pa \end{cases}$$

ب) فشار ناشی از مایع یعنی  $\rho gh$  بنابراین:

$$P = \rho gh \Rightarrow \begin{cases} P_A = ۱ \times ۱۰ \times ۱ \times ۱ \times ۲ = ۱۲ \times ۱۰۰ Pa \\ P_B = ۱ \times ۱۰ \times ۱ \times ۶ = ۶ \times ۱۰۰ Pa \end{cases}$$

پ) فاصله نقاط A و C از سطح آزاد مایع یکسان است. یعنی این دو نقطه هم عمق بوده و فشار در این دو نقطه برابر است.  $P_A = P_C$



**۷۹** الف) از عمق ۵cm تا عمق ۲۰cm

تغییر فشار برابر است با:

$$\Delta P = ۱۰ - ۱۰ = ۰ Pa$$

بنابراین می توان نوشت:

$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow ۰ = \rho \times ۱ \times ۰ \times / ۱۵ \Rightarrow \rho = ۴ \times ۱۰۰ kg/m^3$$

ب) فشار هوای محیط را با استفاده از فشار در عمق ۵cm به دست می آوریم.

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow ۱ \times ۱۰۰ = P_0 + ۴ \times ۱۰۰ \times ۱ \times \frac{۵}{۱۰}$$

$$\Rightarrow ۱ \times ۱۰۰ = P_0 + ۲ \times ۱۰ \Rightarrow P_0 = ۹ \times ۱۰۰ Pa$$

**۸۰** یک شاره ساکن بر سطحی که با آن در تماس است نیروی عمودی وارد می کند. بنابراین در هر سه ظرف نیرویی که آب بر دیواره ظرف وارد می کند، بر دیوارهای عمود است.

**۸۱** الف) با داشتن فشار هوا، نیروی وارد بر هر پنجه به دست می آید. ابتدا مساحت هر پنجه را حساب می کنیم:

$$A = \pi r^2 \Rightarrow A = ۳ \times \left( \frac{۴ \times ۱}{۲} - ۲ \right)^2 \Rightarrow A = ۳ \times (۰/۲)^2 \Rightarrow A = ۰/۱۲ m^2$$

تبدیل به متر

نیروی وارد بر پنجه خواهد شد:

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow F = ۷ \times ۱ \times ۰ \times / ۱۲ \Rightarrow F = ۸ \times ۱۰۰ N$$

ب) فشار در عمق ۵ متری آب را به دست می آوریم:

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow P = ۱ \times ۱۰^۵ + ۱ \times ۱۰۰ \times ۱ \times ۵ = ۱/۵ \times ۱ \times ۰ Pa$$

نیروی حاصل از فشار برابر است با:

$$F = PA \Rightarrow F = ۱/۵ \times ۱ \times ۰ \times ۱ \times ۰ = ۱ \times ۱۰۰ N$$

## مسائل تکمیلی


ارتفاع آب در ظرف برابر است با:

$$P = \rho gh \Rightarrow P = 1000 \times 10 \times \frac{26}{100} = 2600 \text{ Pa}$$

فشار آب خواهد شد:

(ب) با توجه به رابطه  $P = \frac{F}{A}$  نیروی وارد بر کف را بدست می‌آوریم:

$$F = PA \Rightarrow F = 2600 \times 50 \times 10^{-4} = 13 \text{ N}$$



الف) فشار مایع به شکل ظرف بستگی ندارد، بلکه به ارتفاع مایع و چگالی آن بستگی دارد. فشار آب خواهد شد:

$$P = \rho gh \Rightarrow P = 1 \times 10^3 \times 10 \times 20 = 20000 \text{ Pa}$$

(ب) فشار کل را حساب می‌کنیم:

$$P = P_0 + P_{\text{مایع}} \Rightarrow P = 10^5 + 3 \times 10^3 = 103000 \text{ Pa}$$

(پ) نیروی وارد بر کف ظرف توسط مایع خواهد شد:

$$F = P_{\text{مایع}} A \Rightarrow F = 3 \times 10^3 \times 40 \times 10^{-4} = 12 \text{ N}$$

(ت) نیروی کل وارد بر کف ظرف:

$$F = P_{\text{کل}} A \Rightarrow F = 10^5 \times 40 \times 10^{-4} = 4000 \text{ N}$$

(الف) ارتفاع آب در دو ظرف یکسان است. (بنابراین:  $P = \rho gh$ )

(ب) نیروهای وارد بر کف ظرف در هر ظرف ناشی از فشار مایع است.


$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \begin{cases} \xrightarrow{\text{ظرف A}} F_A = P(\pi r^2) \\ \xrightarrow{\text{ظرف B}} F_B = P(\pi \times 4r^2) \end{cases} \Rightarrow \frac{F_A}{F_B} = \frac{1}{4}$$

(پ) هر دو ظرف مشابه و مقدار آب درون آنها یکسان است. بنابراین وزن هر دو ظرف برابر است. از این رو نیرویی که توسط ظرفها بر سطح افقی وارد می‌شود با هم برابر است.

(چ) چوب پنهان در تعادل است و نیروهایی که از دو ظرف بر آن وارد می‌شود با هم برابرند. از سمت چپ نیروی ناشی از فشار آب و فشار هوای چوب پنهان وارد می‌شود و از سمت راست نیروی ناشی از فشار هوای کمک نیروی اصطکاک از خروج چوب پنهان می‌شود. بنابراین:

$$F = F_0 + f \Rightarrow (P_0 + \rho gh)A = P_0 A + f$$

$$f = \rho ghA \Rightarrow f = 1000 \times 10 \times \left( \frac{150 + 50}{100} \right) \times 5 \times 10^{-4} = 10 \text{ N}$$




مایع با چگالی بیشتر نشین می‌شود.

خط تراز را رسماً می‌کنیم. فشار در نقاط M و N با هم برابر است.

$P_M = P_N = P$ . هرچه از نقطه N و M بالاتر می‌رویم فشار به اندازه  $\rho gh$  کاهش می‌یابد. بنابراین

فشار نقاط A و B به ترتیب خواهد شد:

$$\begin{cases} P_B = P - \rho_1 g \frac{h}{100} \\ P_A = P - \rho_2 g \frac{h}{100} \end{cases} \xrightarrow{\rho_1 > \rho_2, \rho_1 = 1/2 g/cm^3, \rho_2 = 1/4 g/cm^3} \begin{cases} P_B = P - 1200 \times 10 \times \frac{2}{100} \\ P_A = P - 900 \times 10 \times \frac{2}{100} \end{cases}$$




اختلاف فشار بین دو نقطه از رابطه  $\Delta P = \rho g \Delta h$  به دست می‌آید که اختلاف ارتفاع بین دو نقطه است.

$$\Delta P_{AB} = \rho g \Delta h_{AB} \Rightarrow P_B - P_A = 2/48 - 2/4 \Rightarrow 0.8 \text{ atm} = \rho g \times 2 \Rightarrow \rho g = 0.4 \quad (1)$$

حال با توجه به شکل:

$$\Delta P_{BC} = P_C - P_B = \rho g \times 3 \xrightarrow{(1)} P_C - 2/48 = 0/12 \Rightarrow P_C = 2/6 \text{ atm}$$

دقیق کردید در حل این مسئله تبدیل یکا انجام ندادیم. فشارها را بر حسب نوشتم و فشار  $P_C$  نیز بر حسب atm به دست آمد.



اختلاف فشار بین دو نقطه در شاره از رابطه  $\Delta P = \rho g \Delta h$  به دست می‌آید که اختلاف ارتفاع قائم دو نقطه است. بنابراین

اختلاف فشار وارد به سطح بالا و پایین در شکل های (الف) و (ب) به صورت زیر می‌باشد.


$$\Delta P_{AB} = \rho_2 g \Delta h_{AB} \Rightarrow \Delta P_{AB} = \rho_2 g a$$

$$\Delta P_{A'B'} = \rho_1 g \Delta h_{A'B'} \Rightarrow \Delta P_{A'B'} = \rho_1 g 2a$$

بنابراین  $\Delta P_{AB} = \Delta P_{A'B'}$  بوده از این رو:

$$\Delta P_{AB} = \Delta P_{A'B'} \Rightarrow \rho_2 g a = \rho_1 g 2a \Rightarrow \rho_2 = 2\rho_1 \Rightarrow \frac{\rho_2}{\rho_1} = 2$$

یک رابطه ریاضی را از روی شکل می‌توانیم بنویسیم.



$$h_W + h_{Hg} = 28 \text{ cm} \quad (1)$$

جرم جیوه و آب برابر است. از این مطلب نیز می‌توانیم به کمک چگالی رابطه دیگری بین  $h_W$  و  $h_{Hg}$  پیدا کنیم.

$$m_{Hg} = m_W \Rightarrow \rho_{Hg} V_{Hg} = \rho_W V_W \Rightarrow \rho_{Hg} Ah_{Hg} = \rho_W Ah_W \Rightarrow 13 \times h_{Hg} = 1 \times h_W \Rightarrow h_W = 13h_{Hg} \quad (2)$$


از رابطه (2) در (1) قرار می‌دهیم.

$$(1), (2) \Rightarrow 13h_{Hg} + h_{Hg} = 28 \Rightarrow h_{Hg} = 2 \text{ cm} \xrightarrow{(2)} h_W = 26 \text{ cm}$$

فشار از طرف دو مایع خواهد شد.

$$P = \rho_W gh_W + \rho_{Hg} gh_{Hg} \Rightarrow P = 1000 \times 10 \times \frac{26}{100} + 13000 \times 10 \times \frac{2}{100} = 2600 + 2600 = 5200 \text{ Pa} = 5.2 \text{ kPa}$$

برای پیدا کردن فشار باید ارتفاع  $2/5L = 250 \text{ cm}^3$  آب درون ظرف را پیدا کنیم. ابتدا قسمت پایین ظرف با حجم  $50 \times 10 = 500 \text{ cm}^3$  پر می‌شود. سپس آب به قسمت بالای ظرف می‌رود.



$$V_{\text{آب}} = V_1 + V_2 \Rightarrow 2500 = 500 + V_2$$

$$\Rightarrow V_2 = 2000 \text{ cm}^3$$

ارتفاع  $h_2$  را حساب می‌کنیم:  
 $2000 = 125h_2 \Rightarrow h_2 = 16 \text{ cm}$

الف) حجم هر دو مایع  $50\text{ cm}^3$  است. ارتفاع هر مایع خواهد شد:

$$\begin{aligned} V &= Ah \Rightarrow 50 = 1 \cdot h \\ \Rightarrow h &= 50\text{ cm} = 0.5\text{ m} \\ P &= \rho_A gh_A + \rho_B gh_B \\ \Rightarrow P &= 1200 \times 1 \times 0.5 + 600 \times 1 \times 0.5 = 900\text{ Pa} \end{aligned}$$

ب) توجه به رابطه  $P = \frac{F}{A}$ ، نیروی وارد بر کف حساب می‌شود.

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = PA \Rightarrow F = 9000 \times 1 \times 10^{-4} \Rightarrow F = 9\text{ N}$$

روش دیگر: فشار را از رابطه  $P = \frac{mg}{A}$  به دست بیاورید:

$$\begin{aligned} \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m &= \rho V \\ \Rightarrow \begin{cases} m_A = 1200 \times 500 \times 10^{-6} \Rightarrow m_A = 0.6\text{ kg} \\ m_B = 600 \times 500 \times 10^{-6} \Rightarrow m_B = 0.3\text{ kg} \end{cases} \\ P = \frac{F}{A} = \frac{m_A g + m_B g}{A} &= \frac{0.6 \times 10 + 0.3 \times 10}{1 \times 10^{-4}} \Rightarrow P = 9000\text{ Pa} \end{aligned}$$

$$F = W_A + W_B = 0.6 \times 10 + 0.3 \times 10 = 9\text{ N}$$

الف) ارتفاع مایع در ظرف دوم، دو برابر ظرف اول است.

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\rho_2 gh_2}{\rho_1 gh_1} \Rightarrow \frac{2h_1}{h_1} = \frac{P_2}{P_1} = 2$$

ب) حجم مایع در ظرف دوم و در نتیجه جرم آن ۸ برابر جرم مایع ظرف اول است.

$$\begin{aligned} \frac{V_2}{V_1} &= \frac{(a_2)^3}{(a_1)^3} = \left(\frac{2a_1}{a_1}\right)^3 = \frac{V_2}{V_1} = 8 \\ \frac{m = \rho V}{m_1} &= \lambda \Rightarrow \frac{W_2}{W_1} = \lambda \Rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \lambda = 8 \end{aligned}$$

با توجه به نمودار در ارتفاع  $40\text{ cm}$  از کف ظرف، فشار مایع صفر شده است. نتیجه می‌گیریم  $h = 0$  شده است، و ارتفاع مایع در ظرف  $40\text{ cm}$  است. اکنون چگالی مایع را به دست می‌آوریم.

$$P = \rho gh \Rightarrow 3000 = \rho \times 1 \times 40 \Rightarrow \rho = 75\text{ kg/m}^3$$

$$P = \rho gh \Rightarrow 2400 = 75 \times 1 \times h \Rightarrow h = 32\text{ m}$$

این فاصله از سطح مایع است، بنابراین فاصله از کف ظرف خواهد شد:

$$0.4 - 0.32 = 0.08\text{ m} = 8\text{ cm}$$

$$A = (2)^2 = 4\text{ m}^2$$

سطح قاعده مکعب:

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow P = \frac{W}{A}$$

فشار وارد بر کف ظرف:

وزن آب درون مکعب و وزن آب درون استوانه برابر است:

$$\begin{aligned} W_{\text{استوانه}} &= W_{\text{مکعب}} \\ \frac{P}{P} = \frac{A_{\text{استوانه}}}{A_{\text{مکعب}}} &= \frac{W_{\text{استوانه}}}{W_{\text{مکعب}}} = 1 \end{aligned}$$

## مسائل امتحانی بارمبنده شده



- ۱ الف) جامد بلورین  $(0/25)$  - نمک طعام  $(0/25)$  (یا الماس) جامد بی‌شكل (یاًمُورف)  $(0/25)$  - شیشه  $(0/25)$  / ب) در جامدهای بلورین مولکول‌ها دارای طرح منظم و تکرارشونده هستند، در حالی که جامدهای بی‌شكل، نظم مشخصی ندارند.  $(0/25)$
- جامدهای بلورین از سرد شدن آرام و جامدهای بی‌شكل از سرد شدن سریع ایجاد می‌شوند.  $(0/25)$

- ۲ الف) پرآمده  $(0/25)$  / ب) پایین‌تر  $(0/25)$  / ب) مایع  $(0/25)$  / ت) کشش سطحی  $(0/25)$  / ث) چند ده  $(0/25)$  / ج) کاهش  $(0/25)$
- ۳ الف) پلاسمای  $(0/25)$  / ب) دمای های بالا  $(0/25)$  / نسبت به  $(0/25)$  / نوسان‌های  $(0/25)$  / پ) بلورین  $(0/25)$  / ب) فلزها  $(0/25)$  / د) معدنی  $(0/25)$  / ت) کندی  $(0/25)$  - به تنیدی  $(0/25)$  - آمورف  $(0/25)$  / ث) رانشی  $(0/25)$  / تراکم ناپذیری  $(0/25)$

- ۴ الف) علمت، کشنش سطحی ناشی از هم‌چسبی مولکول‌های سطح مایع است. / ب) افزایش دمای باعث کاهش هم‌چسبی مولکول‌های مایع شده و سبب راحت‌تر جاری شدن مایع می‌شود / پ) علت آن مربوط به اصل برزلوی است: جریان هوای بالای برزنگت باعث کاهش فشارهای در بالای برزنگت و فشارهای قسمت زیر برزنگت بیشتر بوده و این سبب پف کردن برزنگت می‌شود.  $(0/25)$

- ۵ عمق هر سه نقطه یکسان است، بنابراین:

$$h_A = h_B = h_C \Rightarrow P_A = P_B = P_C$$

- ۶ اختلاف فشار به اختلاف ارتفاع قائم دو نقطه درون شاره بستگی دارد.

$$\Delta ABH: \sin 30^\circ = \frac{\Delta h}{AB} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{\Delta h}{50} \Rightarrow \Delta h = 25\text{ cm}$$

$$\Delta h = 25\text{ cm} \Rightarrow \Delta h = 0.25\text{ m}$$

تبديل یکای چگالی:

$$4\text{ g/cm}^3 = 4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \frac{1\text{ kg}}{10^3\text{ g}} \times \frac{10^6\text{ cm}^3}{1\text{ m}^3} = 4000\text{ kg/m}^3$$

$$\Delta P = \rho g \Delta h \Rightarrow \Delta P = 4000 \times 1 \times 0.25 = 1000\text{ Pa}$$

$$\Rightarrow \Delta P = 1000\text{ Pa} = 1\text{ kPa}$$

- ۷ فشار وارد بر کف دریاچه از رابطه  $P = P_0 + \rho gh$  به دست می‌آید:

$$P = P_0 + \rho gh \Rightarrow 240000 = 90000 + 1200 \times 10 \times h$$

$$150000 = 12000h \Rightarrow h = 12.5\text{ m}$$

- ۸ ابتدا فشار ناشی از جیوه را حساب می‌کنیم.

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow P = \frac{135}{20 \times 10^{-4}} \Rightarrow P = 6750\text{ Pa}$$

ارتفاع جیوه در ظرف را به دست می‌آوریم.

$$\begin{aligned} A_1 &= 1\text{ cm}^2 \\ \Delta cm &= h - H_{\text{جیوه}} \\ A_2 &= 2\text{ cm}^2 \\ P &= \rho_{\text{جیوه}} gh_{\text{جیوه}} \\ \Rightarrow 67500 &= 13/5 \times 1000 \times h_{\text{جیوه}} \\ \Rightarrow h_{\text{جیوه}} &= 0.5\text{ m} \\ h &= 0.5 - 0.5 = 0\text{ m} \end{aligned}$$

## بخش چهارم: چرخه ترمودینامیکی



صفحة ۱۳۹ و ۱۴۰ کتاب درسی



**تعریف** در چرخه ترمودینامیکی، دستگاه پس از طی چند فرایند، به حالت اولیه خود باز می‌گردد.

برای مثال دو چرخه  $P-V$  یکی ساعتگرد و دیگری پاد ساعتگرد را در زیر بررسی کرده‌ایم:

چرخه ترمودینامیکی با نمودار $P-V$ پاد ساعتگرد	چرخه ترمودینامیکی با نمودار $P-V$ ساعتگرد
الف) در چرخه ترمودینامیکی حالت ابتدایی و نهایی بکسان است: $\Delta U_{\text{ابتدایی}} = U_{\text{نهایی}} - U_{\text{چرخه}} = 0$	الف) در چرخه ترمودینامیکی حالت ابتدایی و نهایی بکسان است: $\Delta U_{\text{ابتدایی}} = U_{\text{نهایی}} - U_{\text{چرخه}} = 0$
ب) بنابر قانون اول ترمودینامیک: $\Delta U_{\text{چرخه}} = Q_{\text{چرخه}} - W_{\text{چرخه}} \quad \rightarrow \quad Q_{\text{چرخه}} = \Delta U_{\text{چرخه}} + W_{\text{چرخه}}$	ب) بنابر قانون اول ترمودینامیک: $\Delta U_{\text{چرخه}} = Q_{\text{چرخه}} - W_{\text{چرخه}} \quad \rightarrow \quad Q_{\text{چرخه}} = \Delta U_{\text{چرخه}} + W_{\text{چرخه}}$
پ) در مسئله زیر با استدلال مشخص می‌شود که اندازه کار در چرخه برابر سطح محصور در چرخه است و در چرخه پاد ساعتگرد: $W = S$	پ) در مسئله زیر با استدلال مشخص می‌شود که اندازه کار در چرخه برابر سطح محصور در چرخه است و در چرخه ساعتگرد: $W = -S$



۳۵ مسئله

شکل رویه رو یک چرخه ترمودینامیکی فرضی را نشان می‌دهد که یک دستگاه ترمودینامیکی آن را طی کرده است:

الف) کار انجام شده روی دستگاه در هر فرایند را بر حسب سطح زیر نمودار آن بیابید.

ب) نشان دهید اندازه کل کار انجام شده روی دستگاه برابر با مساحت درون چرخه است.

پ) کار کل انجام شده روی دستگاه مثبت است یا منفی؟ توضیح دهید.

**راه حل** الف) در فرایند ab کار برابر سطح زیر نمودار شکل رویه رو است. دستگاه منبسط شده است و کار محیط روی دستگاه از a تا b منفی است:

$$W_{ab} = -S_{ab} < 0$$

در فرایند bc که یک فرایند تراکم هم‌فشار است، کار برابر سطح زیر نمودار شکل رویه رو است و کار محیط روی دستگاه در این فرایند مثبت است:

$$W_{bc} = +S_{bc} > 0$$

در فرایند تراکمی ca کار مثبت و برابر سطح زیر نمودار در شکل رویه رو است:

$$W_{ca} = +S_{ca} > 0$$

ب) کار کل چرخه برابر است با:

$$W_{abca} = W_{ab} + W_{bc} + W_{ca} = -S_{ab} + S_{bc} + S_{ca} = -S_{abca}$$


پ) با توجه به نمودار سطح زیر فرایند ab از مجموع سطح زیر نمودارهای bc و ca بزرگ‌تر است، از این‌رو:  
 $|S_{ab}| > |S_{bc}| + |S_{ca}| \Rightarrow |W_{ab}| > |W_{bc}| + |W_{ca}|$

چون کار در فرایند ab منفی است، بنابراین جمع کل کارها باید منفی شود.

## مسئله ۳۶:

با توجه به نمودار چرخه‌های (الف) و (ب) جدول را با علامت‌های مثبت، منفی یا صفر کامل کنید.

نام چرخه	Q	W	$\Delta U$
(الف)			
(ب)			




نام چرخه	Q	W	$\Delta U$
(الف)	-	+	صفر
(ب)	+	-	صفر

**راه حل** نمودار (الف) پادساعتگرد است و کار محیط روی دستگاه مثبت و گرمای متبادل شده با دستگاه منفی است. نمودار (ب) ساعتگرد است و کار محیط روی دستگاه منفی و گرمای متبادل شده با دستگاه مثبت است. در هر دو چرخه تغییر انرژی درونی صفر است.

## • تیپ ۴ - ۱: مسائل عددی نمودار چرخه

## مسئله ۳۷:




یک مول گاز آرامانی، چرخه‌ای مطابق شکل را طی می‌کند. گرمایی که گاز در مسیر ABCA با محیط مبادله می‌کند، چند ژول است؟

**راه حل** مساحت داخل چرخه برابر با اندازه کار انجام شده می‌باشد. بنابراین ابتدا باید مساحت مثلث را بدست آوریم:  

$$|W| = S = \frac{\text{ارتفاع} \times \text{قاعده}}{2} = \frac{(3-1) \times 10^5 \times (4-2) \times 10^{-3}}{2} = 200 \text{ J}$$

چرخه ساعتگرد است، بنابراین  $W = -S = -200 \text{ J}$ . تغییر انرژی درونی چرخه برابر صفر است:

$$\Delta U_{ABCA} = 0 \Rightarrow W_{ABCA} = -Q_{ABCA} \Rightarrow Q_{ABCA} = 200 \text{ J}$$



یک گاز آرامانی چرخه‌ای مطابق شکل روبرو طی می‌کند، دمای گاز در حالت (۱) برابر  $15^\circ\text{K}$  است.  
 (الف) دمای گاز در حالت (۳) را بدست آورید.

(ب) کار انجام شده روی چرخه و گرمای مبادله شده در چرخه را حساب کنید.  
 (پ) فرایندهای گرمگیر و گرماده را مشخص کنید.

**راه حل** (الف) با توجه به معادله حالت گاز آرامانی می‌توان نوشت:

$$PV = nRT \Rightarrow \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_3 V_3}{T_3} \Rightarrow \frac{1 \times 100}{150} = \frac{3 \times 300}{T_3} \Rightarrow T_3 = 1350 \text{ K}$$


ب) چرخه پادساعتگرد است از این‌رو:  $W = -S = -(3-1) \times 10^{-1} \times (3-1) \times 10^5 = -4 \times 10^{-4} \text{ J} = -4 \text{ kJ}$  ،  $Q = -W = 4 \text{ kJ}$

پ) در فرایند ۲ → ۱، در حجم ثابت فشار زیاد شده است، طبق رابطه  $P \uparrow = \frac{nR}{V} T \uparrow$ ، باید دما هم زیاد شود. بنابراین  $\Delta T > 0$  و  $\Delta U > 0$  و گاز

( $\Delta U = Q + W$ ) گرمگرفته است. پس فرایند ۲ → ۱، گرمگیر است.

در فرایند ۳ → ۲، در فشار ثابت حجم زیاد شده است، ( $V \uparrow = \frac{nR}{P} T \uparrow$ ) بنابراین دما زیاد شده است.  $\Delta T > 0$  و  $\Delta U > 0$  است. گاز منبسط شده

است، پس  $W_{23} < 0$  و گاز گرمگرفته است.  $\Delta U = Q + W$  و گاز گرمگیر است. در فرایند ۴ → ۳، در حجم ثابت فشار کم شده پس دما کم شده بنابراین  $\Delta U < 0$  و  $Q < 0$  و فرایند گرماده است. در فرایند ۱ → ۴، در فشار ثابت حجم کم شده است، پس دما کم شده و  $W > 0$  بنابراین طبق  $\Delta U = Q + W$  و فرایند گرماده است.



دستگاهی شامل ۵/۰ مول گاز آرمانی، چرخه روبه رو را می‌پیماید که در آن CD فرایند هم‌دما است و مقدار گرمای تبادل شده در فرایندهای BC، DA و AB به ترتیب J ۵۰۰ و J ۱۰۰۰ و J ۳۰۰ است.

(الف) تغییر انرژی درونی در هر فرایند را حساب کرده و سپس، تغییر انرژی درونی گاز در کل چرخه را حساب کنید.  
ب) دما را در نقاط A، B و C بیابید.

**راه حل** (الف) فرایند CD هم‌دما است و تغییر انرژی درونی آن صفر است. فرایند AB فرایند هم‌حجم است که فشار آن در حال افزایش می‌باشد.

$$\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB} \xrightarrow{W_{AB}=0} \Delta U_{AB} = Q_{AB} \Rightarrow \Delta U_{AB} = ۳۰۰\text{ J}$$

تغییر انرژی درونی برابر است با:  
فرایندهای BC و DA هم‌فشار هستند. فرایند BC انبساطی بوده و  $W_{BC} > ۰$  و  $Q_{BC} < ۰$  است. فرایند DA تراکمی بوده و  $W_{DA} > ۰$  و  $Q_{DA} < ۰$  است.

$$W_{BC} = -P\Delta V = -2 \times 1^0.5 \times (3-2) \times 10^{-3} = -200\text{ J}, \quad Q_{BC} = +500\text{ J}$$

$$\Delta U_{BC} = 500 + (-200) = 300\text{ J}$$

$$W_{DA} = -P\Delta V = -1 \times 1^0.5 \times (6-2) \times 10^{-3} = 400\text{ J}, \quad Q_{DA} = -1000\text{ J}$$

$$\Delta U_{DA} = W_{DA} + Q_{DA} = 400 + (-1000) = -600\text{ J}$$

در این صورت تغییر انرژی درونی در چرخه خواهد شد:

$$\Delta U_{ABCDA} = \Delta U_{AB} + \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA} = 300 + 300 + 0 + (-600) = 0$$

بنابراین همان‌طور که بیان شد، تغییر انرژی درونی در یک چرخه صفر است.

ب) دما در نقطه A را با استفاده از معادله حالت به دست می‌آوریم:

$$P_A V_A = nRT_A \Rightarrow 1 \times 1^0.5 \times 2 \times 10^{-3} = 0.5 \times ۸ \times T_A \Rightarrow T_A = ۵۰\text{ K}$$

$$\frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P_B V_B}{T_B} \xrightarrow{V_A = V_B} \frac{1}{50} = \frac{2}{T_B} \Rightarrow T_B = ۱۰۰\text{ K}$$

$$\frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P_C V_C}{T_C} \Rightarrow \frac{1 \times 2}{50} = \frac{2 \times 3}{T_C} \Rightarrow T_C = ۱۵۰\text{ K}$$


#### • تیپ ۴ - ۲: رسم چرخه

#### مسئله ۴۰

گاز آرمانی ابتدا طی یک فرایند تراکمی هم‌دما از حالت a به حالت b می‌رود. سپس طی یک فرایند بی‌درو را، دوباره به حجم اولیه در حالت c باز می‌گردد. سرانجام با یک فرایند هم‌حجم به حالت a می‌رود:

(الف) نمودار P-V چرخه‌ی شده را رسم کنید.

(ب) ثابت کنید قدر مطلق کار در فرایند بی‌درو برابر گرمای مبادله شده در فرایند هم‌حجم است.



**راه حل** (الف) نمودار P-V چرخه به صورت روبه رو خواهد بود:

ب) تغییر انرژی درونی در چرخه برابر صفر است:


فرایند ab هم‌دما است و  $\Delta U_{ab} = ۰$  است، فرایند bc بی‌درو و گرمای مبادله شده  $Q_{bc} = ۰$  است و فرایند ca هم‌حجم است و کار در این فرایند صفر است ( $W_{ca} = ۰$ ). در این صورت:

$$\underbrace{\Delta U_{ab}}_{\text{صفر}} + \underbrace{W_{bc}}_{\text{صفر}} + \underbrace{Q_{bc}}_{\text{صفر}} + \underbrace{W_{ca}}_{\text{صفر}} + \underbrace{Q_{ca}}_{\text{صفر}} = ۰ \Rightarrow W_{bc} = -Q_{ca} \Rightarrow |W_{bc}| = |Q_{ca}|$$

## • تیپ ۴ - ۳: تعیین علامت کار و گرما از روی نمودار

## ۴۱ / مسئله

در چرخه یک گاز آرامانی نشان داده شده در شکل روبرو، مسیر AB هم‌دما و مسیر BC بی‌دررو است. جدول زیر را با گذاشتن علامت مثبت، منفی و یا صفر پر کنید. (دستگاه، گاز آرامانی نت‌اتمی است).



مسیر	Q	W	$\Delta U$	$\Delta T$
AB				
BC				
CD				
DA				

مسیر	Q	W	$\Delta U$	$\Delta T$
AB	-	+	◦	◦
BC	◦	+	+	+
CD	+	-	+	+
DA	-	◦	-	-

راه حل ۷ در سطر اول جدول، فرایند  $B \rightarrow A$ ، فرایند هم‌دما است. پس داریم:

$$\Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W$$

چون فرایند تراکمی است، پس کار در این فرایند مثبت است:

$$Q = 0 \Rightarrow \Delta U = W \rightarrow B \rightarrow C \text{، فرایند بی‌دررو است. پس داریم:}$$

چون فرایند  $C \rightarrow B$  تراکمی است، پس کار طی این فرایند مثبت است:  $W > 0 \Rightarrow \Delta U > 0$

چون انرژی درونی به دما بستگی دارد و تغییرات انرژی درونی مثبت است، پس:  $\Delta T > 0$

در سطر سوم جدول، فرایند  $C \rightarrow D$ ، فرایند هم‌فشار است و چون فرایند انبساطی است، پس کار انجام شده طی این فرایند منفی بوده است:  $W < 0$

دمای  $PV_D > PV_C \Rightarrow T_D > T_C \Rightarrow \Delta T > 0 \Rightarrow \Delta U > 0$  دمای  $T_D > T_C$  است، زیرا در حالت D حجم از حالت C بیشتر می‌باشد. بنابراین:

$\Delta U = Q + W$ ،  $W < 0$ ،  $\Delta U > 0 \Rightarrow Q_{CD} > 0$  با توجه به قانون اول ترمودینامیک:


در سطر آخر جدول، فرایند  $A \rightarrow D$ ، فرایند هم‌حجم است، پس داریم:

دمای  $T_A < T_D$  است، زیرا در حالت A، فشار از حالت D کمتر است، بنابراین:

$P_A V_A < P_D V_D \Rightarrow T_D > T_A \Rightarrow \Delta T < 0 \Rightarrow \Delta U < 0$  بنابراین  $Q < 0$ .

• تیپ ۴ - ۴: نمودارهای  $P-T$  و  $V-T$  چرخه

## ۴۲ / مسئله



در شکل روبرو چرخه مقداری گاز آرامانی رسم شده است. نمودار  $V-T$  و  $P-T$  این چرخه را رسم کنید.

راه حل ۸ فرایندهای ab و cd هم حجم هستند. اما حجم در فرایند cd بیشتر از حجم در فرایند ab است.


بنابراین در نمودار  $P-T$ ، شیب فرایند cd از شیب فرایند ab کمتر است. ( $P = \frac{nR}{V} T$ ). همچنانی


فشار فرایند bc بیشتر از فشار در فرایند da است. اکنون نمودارها را با توجه به آنچه بیان شد، رسم می‌کنیم:

نمودار  $P-T$  فرایندهای هم حجم ab و cd خطهای مایلی هستند که باید از مبدأ بگذرند. فرایند da


یک فرایند هم‌فشار در فشار  $P_1$  بوده که با کاهش حجم، دما نیز کاهش می‌یابد و فرایند bc یک فرایند

هم‌فشار انبساطی است که دمای گاز افزایش می‌یابد. با این داده‌ها نمودار  $P-T$  رسم می‌شود.





در فرایند هم حجم ab، فشار زیاد شده پس دما افزایش می‌یابد. سپس طی فرایند هم فشار از حالت b به حالت c می‌رود که نمودار V-T آن خط مایلی است که از مبدأ می‌گذرد. سپس در فرایند cd در حجم ثابت فشار و در نتیجه دما کاهش می‌یابد و سرانجام از d تا a در یک فرایند هم فشار، حجم و دما کاهش می‌یابد که نمودار آن نیز خطی است که از مبدأ می‌گذرد و نمودار V-T آن نیز ساعتگرد بوده اما نمودار V-T اگر نمودار P-V یک چرخه، ساعتگرد باشد، نمودار P-T آن نیز ساعتگرد بوده اما نمودار V-T آن پاد ساعتگرد است.



نمودار V-T برای نیمول گاز آرامانی مطابق شکل رو به رو است. گرمای مبادله شده در مسیر bca را حساب کنید. ( $R = \lambda J/mol.K$ )

**راه حل** مراحل حل این تیپ مسئله:

۱ ابتدا نوع فرایندها را مشخص می‌کنیم.

فرایند ab هم دما:

فرایند ca هم فشار:

۲ نوشتن تغییر انرژی درونی در چرخه:

$$\Delta U_{abca} = \Delta U_{ab} + \Delta U_{bc} + \Delta U_{ca} = 0 \Rightarrow Q_{bc} + W_{bc} + Q_{ca} + W_{ca} = 0 \xrightarrow{W_{bc} = 0} Q_{bc} + Q_{ca} = -W_{ca} \Rightarrow Q_{bca} = -W_{ca} \quad (I)$$

۳ برای بدست آوردن کار در فرایند هم فشار ca:

$$W_{ca} = -P\Delta V = -nR\Delta T \Rightarrow W_{ca} = -nR(T_a - T_c) \Rightarrow W_{ca} = -0.5 \times 8(400 - 800) \Rightarrow W_{ca} = +1600 \text{ J}$$

۴ اکنون جای گذاری در رابطه (I):

در این بخش نمونه سوالاتی که احتمال طرح در امتحان نهایی دارند، برایت آماده کنیدم تا فوب تمرين کنی. شماره تیپ هر سوال کنارش اومده که آگه نتونستی هل کنی بتوانی از درسنامه اون تیپ رو مطالعه کنی.

## تمرین‌های بخش چهارم


**۴۱۸** کلمه مناسب برای پر کردن جای خالی را انتخاب کنید.

الف) به مجموعه فرایندهایی که دستگاه پس از طی آنها به حالت اولیه خود بازمی‌گردد، (چرخه / ماشین گرمایی) گویند.

ب) در یک چرخه ترمودینامیکی تغییر انرژی درونی ..... (صفر / غیر صفر) و کار انجام شده روی گاز ..... (صفر / غیر صفر) است.

پ) در نمودار ..... اندازه کار انجام شده روی گاز طی یک چرخه برابر سطح ..... (زیر نمودار / محصور) است.

ت) اگر نمودار P-V یک چرخه ساعتگرد باشد کار انجام شده روی گاز ..... (مثبت / منفی) بوده و گرمای مبادله شده بین گاز و محیط ..... (مثبت / منفی) است.




دی - ۹۹

(۱ - ۴)

یک مول گاز آرامانی چرخه‌ای مطابق شکل رو به رو را می‌پیماید: (تیپ ۴ - ۱)

الف) کار انجام شده در کل چرخه را محاسبه کنید.


ب) کل گرمای مبادله شده چقدر است؟



یک گاز آرامانی، چرخه‌ای را مطابق شکل رو به رو پیموده است. (تیپ ۴ - ۱) مسئله ۱۱، صفحه ۱۴۹ کتاب درسی

الف) کار انجام شده روی محیط در این چرخه را حساب کنید.

ب) گرمای مبادله شده با گاز در طی این چرخه را محاسبه کنید.




گاز آرامانی مطابق نمودار روبه رو، طی فرایند AB منبسط می شود و حجم آن از  $4\text{m}^3$  به  $1\text{m}^3$  می رسد.

پس از آن گاز طی دو فرایند مختلف به حالت اولیه باز می گردد. (تیپ ۴ - ۱) مثال ۵ - ۸، صفحه ۱۴۰ کتاب درسی

(الف) کار انجام شده روی گاز در چرخه ABCA را حساب کنید.

(ب) کار انجام شده روی گاز در چرخه ABDA را حساب کنید.




یک گاز آرامانی چرخه نشان داده شده در شکل زیر را می پیمایید. (تیپ ۴ - ۳) مسئله ۱۰، صفحه ۱۴۰ کتاب درسی

(الف) فرایندهای گرمگیر و گرماده را مشخص کنید.

(ب) تغییر انرژی درونی گاز در مسیر ABC چند برابر CDA است؟


(پ) کار و گرمای مبادله شده در این چرخه را حساب کنید.

الف) با توجه به نمودار روبه رو که چرخه یک گاز آرامانی را نشان داده، جدول را با کلمه های (مثبت / منفی / صفر) پر کنید. (تیپ ۴ - ۳)



	Q	W	$\Delta U$
A $\rightarrow$ B			
B $\rightarrow$ C			
C $\rightarrow$ A			


ب) با توجه به نمودار روبه رو که چرخه یک گاز آرامانی را نشان می دهد، جدول را با کلمه های (افزایش، کاهش، ثابت) پر کنید. (تیپ ۴ - ۴)



	انرژی درونی	فشار گاز	حجم گاز
A $\rightarrow$ B			A $\rightarrow$ B
B $\rightarrow$ C			B $\rightarrow$ C
C $\rightarrow$ A			C $\rightarrow$ A


پ) با توجه به چرخه P-T در شکل زیر که مربوط به یک گاز کامل است، خانه های جدول زیر را با کلمات (افزایش - کاهش - ثابت) پر کنید. (تیپ ۴ - ۴)

امتحان نهایی - ۸۵




↓ فرایند / کمیت ←

	انرژی درونی	فشار	حجم	↓ فرایند / کمیت ←
A $\rightarrow$ B				A $\rightarrow$ B
B $\rightarrow$ C				B $\rightarrow$ C
C $\rightarrow$ A				C $\rightarrow$ A




مسئله ۹، صفحه ۱۴۸ کتاب درسی

الف) شکل روبه رو چرخه یک گاز آرامانی را نشان می دهد. اگر مقدار گرمای مبادله شده در این چرخه  $400\text{J}$  باشد، کار انجام شده روی گاز چقدر است؟ (تیپ ۴ - ۱)




ب) نمودار V-T چرخه یک گاز آرامانی مطابق شکل روبه رو است. اگر اندازه گرمای مبادله شده در فرایندهای ab و ba به ترتیب  $700\text{J}$  و  $900\text{J}$  باشد، کار انجام شده روی محیط طی این چرخه چند زول است؟ (تیپ ۴ - ۴)




پ) گاز آرامانی چرخه ای مطابق شکل را طی می کند. اگر گاز در مسیر a,  $J_{96}$  گرما از دست بدهد و در مسیر


b,  $800\text{J}$  گرمای بگیرد، کار انجام شده دستگاه در مسیر b چند زول است؟ (تیپ ۴ - ۱) مسئله ۹، صفحه ۱۴۸ کتاب درسی




الف) شکل رو به رو، چرخه‌ای را نشان می‌دهد که یک گاز آرمانی پیموده است. این چرخه را در دستگاه P-T رسم کنید. (تیپ ۴-۴ و ۴-۲)



ب) شکل رو به رو نمودار چرخه‌ای را نشان می‌دهد که یک گاز آرمانی پیموده است. نمودار این چرخه را در دستگاه V-T رسم کنید. (فرایند CA هم‌دما است.) (تیپ ۴-۴ و ۴-۲)



پ) نمودار فرایندهای آرمانی که مقدار معینی گاز کامل طی می‌کند، مطابق شکل رو به رو است،  
نمودار P-V این چرخه را رسم کنید. (تیپ ۴-۴)




الف) یک گاز آرمانی تک‌اتمی چرخه‌ای شامل سه فرایند متوالی هم‌دما، بی‌دررو و هم‌حجم را طی می‌کند.

(الف) کدام فرایند هم‌دما است؟ (تیپ ۴-۱)

ب) در کدام فرایند گاز با محیط گرمایی مبادله نمی‌کند؟

پ) اندازه کار انجام شده روی گاز طی فرایند بی‌دررو را با اندازه گرمایی مبادله شده بین گاز و محیط در فرایند هم‌حجم با هم مقایسه کنید.

ت) اگر در فرایند هم‌دما، گاز  $J = 20$  گرما بگیرد و در فرایند هم‌حجم به اندازه  $\frac{5}{3}$  گرمای گرفته شده در فرایند هم‌دما، گرما مبادله شود، کار مبادله شده در چرخه چند ژول است؟




نیم مول از یک گاز آرمانی چرخه شکل رو به رو را می‌پیماید. مسیر CA بی‌دررو است. ( $R = 8 \text{ J/mol.K}$ )

(الف) دمای گاز را در نقطه‌های A, B, C و محاسبه کنید. (تیپ ۴-۱)

مسئله ۱۱، صفحه ۱۴۹ کتاب درسی

ب) اگر مقدار کار در فرایند CA برابر  $1860 \text{ J}$  باشد، کل گرمای مبادله شده چند ژول خواهد بود؟




نمودار یک مول گاز آرمانی مطابق شکل رو به رو است. اگر فرایند BC هم‌دما باشد.

(الف) دمای گاز در نقطه C چند کلوین است؟ (تیپ ۴-۱)

مسئله ۱۱، صفحه ۱۴۹ کتاب درسی

(ب) گرمای مبادله شده در مسیر CAB چند ژول است؟ ( $R = 8 \text{ J/mol.K}$ )


(پ) انرژی درونی گاز در نقاط A, B و C را با هم مقایسه کنید.




شکل رو به رو، مربوط به چرخه P-T یک مول گاز آرمانی است. (تیپ ۴-۴)

(الف) حجم گاز در فرایند AB چند لیتر است؟


ب) اگر گرمای مبادله شده بین دستگاه و محیط در فرایند CA,  $J = 5000$  باشد، گرمای مبادله شده با محیط در فرایند AB چند ژول است؟ ( $R = 8 \text{ J/mol.K}$ )




پ) فرایند AB هم فشار بوده و در فشار ثابت، حجم در حال افزایش است. فرایند BC هم حجم است و در حجم ثابت، دما در حال افزایش و در نتیجه فشار نیز در حال افزایش است. ازین‌رو، نمودار P-V به شکل روبرو است.




الف) نمودار به صورت روبروست.



ب) با توجه به اینکه دمای اولیه و نهایی با هم برابر است پس نقاط C و a باید روی یک نمودار هم دما قرار داشته باشند. در فرایند هم فشار حجم گاز زیاد شده. ازین‌رو دما ابتدا افزایش و سپس در فرایند بی‌درو فشار کاهش و حجم افزایش می‌باید، ابتدا دما از T1 به T2 و سپس از T2 به T1 میرسد.



پ) با دو برابر شدن حجم گاز فشار گاز طی فرایند هم دما نصف می‌شود. بنابراین نمودار به صورت نمودار ab است. در فرایند بی‌درو و قوتی حجم گاز از 2V به V رسید یعنی حجم نصف می‌شود، فشار گاز از دو برابر بیشتر افزایش می‌باید. فرایند bc بی‌درو است.




الف) فرایند اول هم حجم است و دما و در نتیجه فشار افزایش یافته است و نمودار باید از مبدأ بگذرد. نقطه A نشان‌دهنده حالت اول گاز و نقطه B نشان‌دهنده حالت دوم گاز است. نمودار AB فرایند (الف) را نشان می‌دهد.



ب) فرایند دوم در فشار ثابت انجام شده و در آن دما و حجم افزایش یافته است. نقطه C حالت سوم گاز و نمودار BC فرایند (ب) را نشان می‌دهد.


الف) چرخه ب) صفر - غیرصفر - پ - محصورت) منفی - مثبت



الف) کار انجام شده در کل چرخه برابر سطح محصور در چرخه است و چون چرخه ساعتگرد است، کار محیط روى دستگاه منفی است:

$$|W| = S \Rightarrow |W| = \frac{(4-1) \times 10^5 \times (6-2) \times 10^{-3}}{2} = 60 \text{ J} \Rightarrow W = -60 \text{ J}$$

ب) در یک چرخه  $W_t = -Q_t$  بنابراین  $W_t = -Q_t = 60 \text{ J}$  است.




نمودار bc، یک نمودار مبدأ گذراست یعنی فرایند bc یک فرایند هم فشار است. بنابراین فرایند bc هم فشار می‌باشد و کار در فرایند هم فشار خواهد شد:

$$W_{bc} = -nR\Delta T = -1 \times 8 \times (-300) = 2400 \text{ J}$$

$$W_{\text{کل}} = W_{ab} + W_{bc} = 0 + 2400 = 2400 \text{ J}$$


با توجه به نمودار  $T_a = T_c$  است و تغییر انرژی درونی در فرایند صفر  $\Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W = -2400 \text{ J}$  است از این‌رو:

الف) فرایند ab هم فشار است. بنابراین نمودار V-T آن خط راست گذرنده از گذرنده از مبدأ است و فرایند bc هم حجم است و طی فرایند bc، فشار کاهش یافته در نتیجه دمای نیز کاهش می‌باید.




ب) فرایند AB هم حجم است بنابراین نمودار P-T آن خط راست گذرنده از مبدأ است و در این فرایند فشار و دما افزایش می‌باید.

فرایند BC هم فشار و فرایند CD هم دما است: از این‌رو:




پ) فرایند BC خط راست گذرنده از مبدأ است بنابراین BC یک فرایند هم فشار است که طی آن حجم و دمای گاز کاهش می‌باید. فرایند AB یک فرایند هم حجم است که طی آن دما افزایش می‌باید بنابراین نمودار P-V آن خواهد شد:



الف) به نمودار دقت کنید نمودار V-T است.

الف) به کمک قانون گازها، فشار گاز در حالت A را بدست می‌آوریم.

$$PV = nRT \Rightarrow P_A = \frac{nRT_A}{V_A} \Rightarrow P_A = \frac{1 \times 8 \times 50}{5 \times 1} = 8 \times 10^4 \text{ Pa}$$



ب) نمودار فرایند AB یک نمودار مبدأ گذراست بنابراین فرایند AB، فرایند هم فشار است و کار انجام شده در این فرایند برابر است با:

$$W_{AB} = -P\Delta V \Rightarrow W_{AB} = 8 \times 10^4 \times (20 - 5) \times 10^{-3} = -1200 \text{ J}$$


فرایند  $A \rightarrow C$ : چون گاز متراکم شده است  $\Delta V < 0$  و در نتیجه  $\Delta U < 0$  است. از طرفی:

$$\frac{P_C V_C}{T_C} = \frac{P_A V_A}{T_A} \Rightarrow \frac{3 \times 3}{T_C} = \frac{1 \times 1}{T_A} \Rightarrow T_A = \frac{1}{9} T_C$$

یعنی در این فرایند دمای گاز کاهش یافته است. بنابراین  $\Delta U < 0$  است. با توجه به قانون اول ترمودینامیک،  $Q$  نیز باید منفی باشد.

مثبت منفی

$$\Delta U = W + Q \Rightarrow Q < 0$$



	Q	W	$\Delta U$
$A \rightarrow B$	+	-	+
$B \rightarrow C$	+	0	+
$C \rightarrow A$	-	+	-

ب) در فرایند AB حجم گاز افزایش یافته و چون دما ثابت است، انرژی درونی ثابت می‌ماند. همچنین  $PV \uparrow = nRT$  فشار گاز کاهش می‌یابد.

در فرایند BC، مطابق نمودار حجم گاز کاهش می‌یابد. ( $V_C < V_B$ ) اما دمای گاز افزایش می‌یابد. با توجه به معادله حالت گاز آرمانی خواهیم داشت:


$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT \uparrow}{V \downarrow} \Rightarrow P \uparrow$$

دمای گاز افزایش یافته بنابراین انرژی درونی گاز افزایش می‌یابد. فرایند CA هم حجم است و دما کاهش یافته است در این صورت فشار و انرژی درونی کاهش می‌یابد.

انرژی درونی	فشار گاز	حجم گاز	
ثابت	کاهش	افزایش	$A \rightarrow B$
کاهش	افزایش	کاهش	$B \rightarrow C$
کاهش	کاهش	ثابت	$C \rightarrow A$

پ) فرایند AB: نمودار  $P-T$  مبدأ گذر و بنابراین هم حجم است و چون دما در حال افزایش بوده و انرژی درونی گاز آرمانی تنها تابع دماست پس انرژی درونی در حال افزایش است:

انرژی درونی	فشار	حجم	
افزایش		ثابت	$A \rightarrow B$



فرایند BC: برای بررسی فرایند BC مطابق شکل تعدادی نمودار  $P-T$  هم حجم رسم می‌کنیم. از حالت B تا حالت C شیب این نمودارها در حال کاهش است. با توجه به اینکه شیب خطهای مبدأ گذر  $P-T$  با حجم رابطه عکس دارند پس حجم در حال افزایش است.

انرژی درونی	فشار	حجم	
کاهش		افزایش	$B \rightarrow C$

فرایند CA: فرایند هم فشار است. دما در حال کاهش بوده و انرژی درونی کاهش می‌یابد:

انرژی درونی	فشار	حجم	
کاهش		ثابت	$C \rightarrow A$

الف) اندازه کار انجام شده روی گاز در یک چرخه برابر مساحت درون چرخه است. چون چرخه پاد ساعتگرد است، کار انجام شده روی گاز مثبت است: بنابراین:

$$|W| = S \Rightarrow W = \frac{1}{2} (DC + AB) \times AD$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2} (6+4) \times 8 \times 10^{-3} \Rightarrow W = 6000 \text{ J}$$

کار انجام شده روی محیط:

ب) تغییر انرژی درونی در یک چرخه برابر صفر است. بنابراین با توجه به قانون اول ترمودینامیک داریم:  $\Delta U = W + Q \Rightarrow 0 = 6000 + Q \Rightarrow Q = -6000 \text{ J}$  بنابراین گاز در این چرخه  $6000 \text{ J}$  گرمایی از دست داده است.

الف) اندازه کار خالص انجام شده برابر مساحت درون چرخه در نمودار  $P-V$  است.

الف) در چرخه ABCA که یک چرخه پاد ساعتگرد است، کار محیط روی گاز مثبت است.

$$|W_{ABCA}| = \left( \frac{40-1}{2} \right) \times (4-1) \Rightarrow W_{ABCA} = 45 \text{ J}$$

ب) در چرخه ABDA که ساعتگرد است، کار محیط روی گاز منفی است.

$$|W_{ABDA}| = \left( \frac{40-1}{2} \right) \times (4-1) = 45 \text{ J} \Rightarrow W_{ABDA} = -45 \text{ J}$$

الف) فرایند AB یک فرایند انساطی فرایند هم حجم است که دما و فشار گاز با دریافت گرمایش یافته است بنابراین فرایند AB گرمایگر است.

فرایند BC یک فرایند انساطی هم فشار است که طی آن حجم گاز با دریافت گرمایش یافته است بنابراین: فرایند BC گرمایگر است. در فرایند هم حجم CD، گاز گرمایی از دست داده و فشار و دمای آن کاهش می‌یابد بنابراین فرایند CD گرماده است.

در فرایند هم فشار DA، گاز گرمایی از دست داده و حجم و دمای آن کاهش می‌یابد. بنابراین فرایند DA گرماده است.

ب) چرخه را به صورت زیر می‌توان نوشت:

$$\Delta U_{ABCDA} = \Delta U_{ABC} + \Delta U_{CDA}$$

$$\Rightarrow 0 = \Delta U_{ABC} + \Delta U_{CDA} \Rightarrow \frac{\Delta U_{ABC}}{\Delta U_{CDA}} = -1$$

پ) اندازه کار برابر سطح داخل چرخه است.

$$|W| = S \Rightarrow |W| = (4-2) \times 10^5 \times (200-100) \times 10^{-3} \Rightarrow |W| = 40000 \text{ J}$$

چرخه ساعتگرد بوده و کار محیط روی دستگاه منفی است از این‌رو:  $W = -40000 \text{ J} \Rightarrow Q = -W \Rightarrow Q = 40000 \text{ J}$

الف) با استفاده از قانون اول ترمودینامیک  $\Delta U = Q + W$  داریم:

فرایند A-B: در این فرایند هم فشار گاز منبسط شده است  $\Delta V > 0$  و در

نتیجه  $W < 0$  است. با توجه به اعداد روی نمودار از طرفی  $P_B V_B > P_A V_A$  است. بنابراین  $T_B > T_A$  است. بنابراین  $\Delta U > 0$  بوده و

ترمودینامیک باید  $Q > 0$  باشد. این فرایند هم حجم است بنابراین  $W_{BC} = 0$  است از طرفی

فشار گاز افزایش یافته بنابراین گاز گرمایش دریافت کرده و  $Q > 0$  است در نتیجه

نیز مثبت است.  $\Delta U = Q > 0$