



نستلهای
نسترهای




مرحله‌ای
و جامع

ویژه آمادگی شرکت در امتحان‌های نهایی و نیمسال

زیست‌شناسی دوازدهم

پوریا برزین



امتحان‌های
شبیه‌ساز نهایی

امتحان‌های
نیمسال اول و
دوم

امتحان‌های
گفتار به گفتار

پاسخ‌های
تشریحی +
کلید تصمیح

نکات آموزشی
برای مرور

امتحان‌های
نهایی اخیر

پیشگفتار

تقدیم به کسانی که خود، آینده‌شان را می‌سازند.

به نام خدا

دروド بر همه اساتید، مشاوران و دانشآموزان عزیز!

مقدمه اولین بخش هر کتابی است که معمولاً آخر از همه نوشته می‌شود و من اکنون که به سراغ نوشتمن مقدمه این کتاب آمده‌ام، بسیار خشنودم زیرا توانسته‌ام اولین کتاب ویژه آمادگی در امتحان‌های نهایی سبک جدید زیست‌شناسی را تألیف کنم. تألیف این کتاب مقارن با دوره‌ای بود که من در حال گذراندن کشیک‌های بخش اطفال در بیمارستان بودم و در فرسته‌های استراحت اندکی که داشتم، تألیف کتاب را پیش می‌بردم و تمام تلاش خود را می‌کردم تا کتابی در خور تقدیم شما دانشآموزان عزیز کنم.

در تألیف این کتاب به سبک جدید سؤالات امتحان نهایی، توجه شده است و من و تیم همکارانم در نشر الگو کوشیده‌ایم تا این کتاب پاسخگوی نیاز شما دانشآموزان عزیز برای کسب نمره بالا در امتحان نهایی باشد.

در گذشته، سؤالات امتحان‌های نهایی بیشتر به صورت پرسش‌هایی صرفاً حفظی از متن کتاب درسی بودند؛ اما در چند سال اخیر، نحوه طرح سؤالات تغییر کرده است و سؤالات امتحانی از نکات ریز کنکوری و همچنین نکات ریزی که مربوط به شکل‌های کتاب درسی هستند، طرح می‌شوند، همچنین نکات تست‌های کنکور سال‌های قبل، به صورت سؤال تشریحی در امتحان نهایی مطرح می‌شود.

ما در این کتاب تمام نکات کنکورهای سراسری از سال ۱۳۸۹ تا آخرین کنکور برگزار شده را در قالب سؤالات تشریحی گنجانده و طرح کرده‌ایم. با توجه به امتحان‌های نهایی سال‌های اخیر، دیگر مرزی بین امتحان نهایی و کنکور سراسری در درس زیست‌شناسی وجود ندارد و این کتاب شما را برای رویارویی با نکات کنکوری مطرح شده در امتحان نهایی، آماده می‌کند.

ما در این کتاب سعی خود را بر پوشش چنین مطالبی در قالب سؤالات امتحانی قرار داده‌ایم. می‌توان گفت که این کتاب در سه بخش، تألیف شده است.

بخش اول: امتحان‌های گفتار به گفتار (۱۰ نمره‌ای) و امتحان‌های جامع نیمسال اول و نیمسال دوم (۲۰ نمره‌ای)

این بخش شامل ۲۳ آزمون گفتار به گفتار، ۴ آزمون جامع نیمسال اول و ۲ آزمون جامع نیمسال دوم است که برای استفاده در طول سال تحصیلی، همگام با تدریس معلم طراحی شده است. آزمون‌های جامع نیمسال اول و دوم نیز به شما در آمادگی برای امتحانات نرم اول و نهایی کمک خواهند کرد.

برای استفاده از آزمون‌ها، بهتر است ابتدا گفتار مربوطه را از کتاب درسی مطالعه کنید. ضمناً در پاسخنامه تشریحی کتاب نیز، شماره صفحات مربوط به آن پاسخ در کتاب درسی، ذکر شده است که می‌توانید در صورت نیاز برای مطالعه و فهم بهتر هر سؤال، به راحتی به قسمت مربوط به آن در کتاب درسی مراجعه کنید.

یه چیزی رو فراموش نکنید، رمّ موققیت در درس زیست‌شناسی تکراره!

پس هر چیزی رو فراموش کردید، همان وقت به کتاب درسی مراجعه کنید و مطالعه کنید.

همچنین در بین سؤال‌های تألفی نمونه سؤال‌های مناسبی که از امتحان‌های نهایی انتخاب شده‌اند، قرار داده‌ایم تا با دید طراح سؤال امتحان نهایی نیز آشنا شوید.

بخش دوم: آزمون‌های جامع شبیه‌ساز نهایی و آزمون‌های نهایی سال‌های اخیر (۲۰ نمره‌ای)

این بخش از کتاب، برای استفاده در بازه امتحان‌های نهایی تأثیر شده است. ۵ آزمون شبیه‌ساز نهایی و ۶ آزمون نهایی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای مرور کل نکات آزمون‌های قبلی و همچنین بررسی نکات جدید، آورده شده است. صفر تا صد هر قسمت از کتاب درسی که امکان طرح سؤال در امتحان نهایی را دارد در این آزمون‌ها پوشش داده شده است و به نوعی بهترین پیش‌بینی از هر مدل امتحان نهایی درس زیست‌شناسی خواهد بود. (نوستراداموس رُمانه‌اش را پشتیبانی!)

در نهایت، برای تضمین موقیت در امتحان نهایی، بررسی سؤالات آزمون‌های نهایی سال‌های اخیر الزامی است. (این‌و همه میدوئن! همه‌ی!) آزمون‌های نهایی سال‌های اخیر را در یک روز مانده به امتحان مطالعه کنید و بروید برای موجی از نمرات بیست!

بخش سوم: پاسخنامه تشریحی و راهنمای تصحیح

تک‌تک سؤالات این کتاب، پاسخ‌نامه کاملاً تشریحی دارند که نکات مفیدی را به شما آموزش می‌دهند. همچنین در این کتاب نحوه بارگذاری سؤالات را که دانستن آن برای کسب نمره بالا در امتحان نهایی لازم است، یاد می‌گیرید. شماره صفحاتی از کتاب درسی که هر سؤال از آن صفحات طرح شده، در قسمت پاسخ آورده شده است تا بتوانید به کتاب درسی مراجعه و قسمت مربوط را مرور کنید. در قسمت پاسخ‌نامه آزمون‌های جامع شبیه‌ساز نهایی، کادرهای نکته برای مرور نکات مهم امتحانی آورده شده‌اند. دیگه چی می‌خواهی؟! سؤالات و نکات این کتاب بسیار با وسوس و با دید طراح امتحان نهایی و به دور از نظرات سلیقه‌ای و نکات مبهم طرح شده‌اند. با این حال هر گونه اشکال و ایراد علمی و غیرعلمی را که در کتاب مشاهده کردید، می‌توانید از طریق سایت نشر الگو به نشانی www.olgoobooks.ir با ما در میان بگذارید..

در پایان لازم می‌دانم تشکر کنم از:

- پدر و مادر عزیزم که هر آن‌چه اکنون هستم و هر آن‌چه را که دارم، مدیون وجود بالارزش ایشان هستم.
- استاد عزیزم دکتر اشکان هاشمی که بدون مطالعه کتاب‌های ایشان کسب رتبه ۱۰ در کنکور سراسری برایم غیرممکن بود و فرصت نوشتمن این کتاب را به بندۀ سپرده‌ند تا بتوانم خدمتی به دانش‌آموزان عزیز انجام دهم.
- ویراستاران محترم سرکار خانم ارمغان صبح‌خیز و سرکار خانم تارا عینالو که بدون دقت نظر آن‌ها، نوشتمن کتابی کم‌نقص ممکن نبود.
- تمامی اساتید، مشاوران و دانش‌آموزان عزیزم که بدون نظرات آن‌ها، کتابی که در دست دارید با این کیفیت علمی ارائه نمی‌شد.
- واحد تألیف انتشارات الگو به سپرستی خانم ستین مختار که در فرایند تهیه کتاب و خانم مریم احمدی که در فرایند صفحه‌آرایی کتاب، زحمات زیادی کشیدند.

خدمت‌گزار شما

پوریا بزرگی

فهرست مطالب

آزمون‌های فصل به فصل و نیمسال

۲۹ آزمون ۱۶: فصل ۵ - گفتار ۱	۲ آزمون ۱: فصل ۱ - گفتار ۱
۳۰ آزمون ۱۷: فصل ۵ - گفتار ۲	۳ آزمون ۲: فصل ۱ - گفتار ۲
۳۲ آزمون ۱۸: فصل ۵ - گفتار ۳	۵ آزمون ۳: فصل ۱ - گفتار ۳
۳۴ آزمون ۱۹: فصل ۶ - گفتار ۱	۶ آزمون ۴: فصل ۲ - گفتار ۱
۳۵ آزمون ۲۰: فصل ۶ - گفتار ۲	۸ آزمون ۵: فصل ۲ - گفتار ۲
۳۷ آزمون ۲۱: فصل ۶ - گفتار ۳	۹ آزمون ۶: فصل ۲ - گفتار ۳
۳۸ آزمون ۲۲: فصل ۷ - گفتار ۱	۱۱ آزمون ۷: فصل ۳ - گفتار ۱ و ۲
۴۰ آزمون ۲۳: فصل ۷ - گفتار ۲	۱۲ آزمون ۸: فصل ۳ - گفتار ۲
۴۱ آزمون ۲۴: فصل ۷ - گفتار ۳	۱۳ آزمون ۹: فصل ۴ - گفتار ۱
۴۳ آزمون ۲۵: فصل ۸ - گفتار ۱	۱۵ آزمون ۱۰: فصل ۴ - گفتار ۲
۴۴ آزمون ۲۶: فصل ۸ - گفتار ۲	۱۶ آزمون ۱۱: فصل ۴ - گفتار ۳
۴۶ آزمون ۲۷: فصل ۸ - گفتار ۳	۱۸ آزمون ۱۲: نیمسال اول (۱)
۴۷ آزمون ۲۸: نیمسال دوم (۱)	۲۱ آزمون ۱۳: نیمسال اول (۲)
۵۰ آزمون ۲۹: نیمسال دوم (۲)	۲۳ آزمون ۱۴: نیمسال اول (۳)
	۲۶ آزمون ۱۵: نیمسال اول (۴)

آزمون‌های جامع (شبیه‌ساز نهایی و نهایی)

آزمون ۳۶: جامع (۷) - نهایی شهریور ۱۴۰۲	۷۰	آزمون ۳۰: جامع (۱) شبیه‌ساز نهایی	۵۲
آزمون ۳۷: جامع (۸) - نهایی دی ۱۴۰۲	۷۳	آزمون ۳۱: جامع (۲) شبیه‌ساز نهایی	۵۵
آزمون ۳۸: جامع (۹) - نهایی خرداد ۱۴۰۳	۷۵	آزمون ۳۲: جامع (۳) شبیه‌ساز نهایی	۵۸
آزمون ۳۹: جامع (۱۰) - نهایی شهریور ۱۴۰۳	۷۹	آزمون ۳۳: جامع (۴) شبیه‌ساز نهایی	۶۱
آزمون ۴۰: جامع (۱۱) - نهایی دی ۱۴۰۳	۸۱	آزمون ۳۴: جامع (۵) شبیه‌ساز نهایی	۶۴
پاسخ‌های تشریحی	۸۵	آزمون ۳۵: جامع (۶) - نهایی خرداد ۱۴۰۲	۶۷

موضوع آزمون

۵

آزمون

صفحات پاسخ

۹۱ تا ۹۰

فصل ۲ - گفتار ۲: به سوی پروتئین

ترنیپ و قایع در هر یک از مراحل تدریجی، سؤال قطعی امتحان نهایی و کنکورها!

ردیف	امتحان نهایی: زیست‌شناسی ۳	رشته: علوم تجربی	تألیفی	مدت امتحان: ۵۰ دقیقه
ردیف	سوالات			نمره
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. الف) هر tRNA که فقط حامل یک آمینواسید است، ابتدا به جایگاه A ریبوزوم وارد می‌شود. ب) در ساختار سه بعدی tRNA، حلقه‌های جانبی مولکول در نزدیکی هم قرار می‌گیرند. پ) فرایند پروتئین‌سازی از ابتدای مولکول mRNA آغاز می‌شود. ت) در فرایند ترجمه، پس از استقرار سومین رنای ناقل در جایگاه A ریبوزوم، اولین رنای ناقل از جایگاه E ریبوزوم خارج می‌شود.			۱
۲	در هر یک از عبارت‌های زیر، جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. الف) ریبوزوم از طرف زیرواحد خود، به شبکه آندوپلاسمی متصل می‌شود. (خرداد ۱۴۰۲) ب) رمزه (کدون) آغاز، هرگز وارد جایگاه نمی‌شود. پ) در مرحله پایان ترجمه، پروتئین‌هایی به نام وارد ریبوزوم می‌شوند و سبب می‌گردند پلی‌پیتید از آخرین رنای ناقل جدا شود. ت) در یاخته‌ها، آنزیم‌های ویژه‌ای وجود دارند که بر اساس توالی آمینواسید مناسب را به رنای ناقل متصل می‌کنند.			۱
۳	برای کامل کردن هر یک از عبارت‌های زیر، از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب کنید. الف) پروتئین‌هایی که پس از تولید به میتوکندری فرستاده می‌شوند، از دستگاه گلزاری عبور (می‌کنند - نمی‌کنند). ب) در فرایند ترجمه، تشکیل اولین پیوند پیتیدی (قبل - بعد) از اولین حرکت ریبوزوم روی رنای پیک صورت می‌گیرد. پ) پس از قرارگیری چهارمین رنای ناقل در جایگاه A، ریبوزوم برای (سومین - چهارمین)، بار به اندازه یک کدون جایه‌جا می‌شود. ت) رشته پیتیدی متصل به رنای ناقل جایگاه P، از سمت گروه (آمینی - کربوکسیلی) خود به رنای ناقل اتصال دارد.			۱
۴	چرا در پروکاریوت‌ها ممکن است ترجمه یک رنای پیک، قبل از پایان رونویسی آن آغاز شود؟			۰/۲۵
۵	وقایع زیر مربوط به مرحله آغاز ترجمه است. آن‌ها را بر اساس ترتیب زمان وقوع مرتب کنید. «اتصال رنای ناقل حامل متیونین به رمزه آغاز - کامل شدن ساختار ریبوزوم - اتصال زیرواحد کوچک رناتن به رنای پیک»			۰/۷۵
۶	شکل زیر طرح ساده‌ای از رناتن (ریبوزوم)‌هایی است که چند رنای در حال رونویسی را ترجمه می‌کنند. با توجه به شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (خرداد ۱۴۰۳) الف) کدام شماره «۱» یا «۲» موقعیت قرارگیری راهانداز را نشان می‌دهد؟ ب) کدام رناتن فرایند ترجمه را زودتر آغاز کرده است؟ «A» یا «B»؟ پ) این فرایند در کدام بخش از یاخته‌های بدن انسان قابل مشاهده است؟			۰/۷۵
۷	درباره جایگاه اتصال به آمینواسید در ساختار رنای ناقل، به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) این جایگاه در ساختار خود چند نوکلوتید دارد؟ ب) چه تعداد از نوکلوتیدهای آن به آمینواسید متصل می‌شوند؟ پ) آیا این جایگاه با سایر بخش‌های رنای ناقل پیوند هیدروژنی برقرار می‌کند؟ ت) آیا این جایگاه در رنهای ناقل مختلف، توالی نوکلوتیدی مشابهی دارد؟ چرا؟			۱/۲۵
۸	مشخص کنید هر یک از پروتئین‌های زیر توسط کدام ریبوزوم (متصل به شبکه آندوپلاسمی زیر یا آزاد در سیتوپلاسم) ساخته می‌شوند. الف) هلیکاز ب) عامل آزادکننده پ) پمپ سدیم - پتاسیم			۱



ردیف	سوالات	نمره										
۹	جدول زیر درباره ویژگی‌های مراحل مختلف ترجمه است. هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آن‌ها را پیدا کنید. (یکی از موارد ستون «ب» اضافی است)	۰/۷۵										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ب</th> <th>الف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱) پیوند پپتیدی شکسته می‌شود.</td> <td>الف) آغاز</td> </tr> <tr> <td>۲) آخرین حرکت ریبوزوم روی mRNA مشاهده می‌شود.</td> <td>ب) طویل شدن</td> </tr> <tr> <td>۳) زیرواحد کوچک رناتن، کدون AUG را شناسایی می‌کند.</td> <td>پ) پایان</td> </tr> <tr> <td>۴) خروج رنای ناقل از جایگاه P رناتن دیده می‌شود.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ب	الف	۱) پیوند پپتیدی شکسته می‌شود.	الف) آغاز	۲) آخرین حرکت ریبوزوم روی mRNA مشاهده می‌شود.	ب) طویل شدن	۳) زیرواحد کوچک رناتن، کدون AUG را شناسایی می‌کند.	پ) پایان	۴) خروج رنای ناقل از جایگاه P رناتن دیده می‌شود.		
ب	الف											
۱) پیوند پپتیدی شکسته می‌شود.	الف) آغاز											
۲) آخرین حرکت ریبوزوم روی mRNA مشاهده می‌شود.	ب) طویل شدن											
۳) زیرواحد کوچک رناتن، کدون AUG را شناسایی می‌کند.	پ) پایان											
۴) خروج رنای ناقل از جایگاه P رناتن دیده می‌شود.												
۱۰	شکل زیر یکی از عوامل لازم ترجمه در سیتوپلاسم یاخته جانوری را نشان می‌دهد. با توجه به شکل، به سوالات زیر پاسخ دهید.  (د) ۱۴۰۲ با تغییر) الف) انواع آنزیم‌های رونویسی کننده از ژن‌های سازنده این عامل را نام ببرید. ب) رشته پپتیدی در حال ساخت، از کدام زیرواحد آن بیرون می‌زند؟	۰/۷۵										
۱۱	درباره فرایند و عوامل لازم در ترجمه به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) چرا تعداد انواع پادرمزه‌ها کمتر از رمزه‌هاست؟ ب) هنگام ترجمه همزمان یک رنای پیک توسط چندین رناتن، به ترتیب «دانه‌های تسبیح» و «نخ تسبیح» به چه مواردی اشاره دارند؟ پ) چه رابطه‌ای بین طول عمر رنای پیک یاخته‌ها با میزان پروتئین‌سازی آن‌ها وجود دارد؟	۱/۵										
۱۰	موفق باشد.											



مقایسه تنظیم مثبت و منفی E.coli، مهم ترین قسمت این کفتار است.



ردیف	سوالات	رشته: علوم تجربی	تألیفی	مدت امتحان: ۵۰ دقیقه
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. الف) هنگام اتصال مهارکننده به اپراتور، هیچ یک از مراحل رونویسی از ژن‌های آنزیم‌های تجزیه کننده لاکتوز شروع نمی‌شود. ب) پس از ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی متصل به راهانداز در تماس با توالی افزاینده قرار می‌گیرند. پ) تغییر طول عمر رنای پیک، از روش‌های مشترک تنظیم بیان ژن در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌هاست. ت) توالی‌های اپراتور همانند جایگاه اتصال فعل کننده و برخلاف توالی افزاینده، رونویسی نمی‌شوند.			۱
۲	در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. الف) در باکتری اشرشیاکلای، توالی خاصی که بین راهانداز و ژن‌های مربوط به تجزیه لاکتوز قرار گرفته است توسط پروتئین اشغال می‌شود. ب) اتصال برخی از به رنای پیک، سبب جلوگیری از کار رناتن و توقف ترجمه می‌شود. پ) به طور معمول، تنظیم بیان ژن پروکاریوت‌ها در مرحله انجام می‌شود. ت) در پی تغییر محیط کشت باکتری E.coli از محیطی که تنها قند آن گلوكوز است به محیطی که تنها قند آن است، رنابسپاراز بر روی توالی نوکلئوتیدی مجاور راهانداز قرار می‌گیرد.			۱



ردیف	سوالات	نمره
۱۵	<p>۰/۷۵ ژن نمودهای زیر در ارتباط با رنگ نوعی ذرت هستند. با توجه به آن‌ها، به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>AaBbCc (۳) AAAbbCC (۲) Aabbcc (۱) AABbCC (۵) AaBBCc (۴)</p> <p>(الف) رخ نمود (فنتوتیپ) کدام یک از ژن نمودهای نسبت به سایرین از فراوانی بیشتری برخوردار است؟ (ب) دو ژن نمودی که سبب ایجاد رخ نمود مشابه می‌شوند را انتخاب کنید.</p>	۰/۷۵ (خرداد ۱۴۰۲)
۱۶	<p>از ازدواج مردی سالم از نظر هموفیلی و یک زن، همه فرزندان پسر آن‌ها هموفیل می‌شوند. ژنوتیپ همه فرزندان را با رسم مربع پانت نشان دهید.</p>	۱
۱۷	<p>در ارتباط با سنگواره‌ها، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) یک مثال از سنگواره شامل همه قسمت‌های بدن جاندار بنویسید. (ب) کدام بخش از درخت گیسو به شکل سنگواره در آمده است؟</p>	۰/۷۵ (خرداد ۱۴۰۲)
۱۸	<p>چرا بسیاری از جهش‌ها، ممکن است تشخیص داده نشوند؟</p>	۰/۵
۱۹	<p>شکل رو به رو، نوعی عامل برهم‌زننده تعادل جمعیت را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) نام این عامل را بنویسید. (ب) چه تأثیری بر توان بقای جمعیت دارد؟ (پ) تفاوت آن با انتخاب طبیعی چیست? (ت) اثر آن، چه رابطه‌ای با اندازه جمعیت دارد؟ (مستقیم یا معکوس)</p> <p>جمعیت اولیه کاهش شدید مانده جمعیت برجای</p>	۱
۲۰	<p>در مورد تغییر در اطلاعات وراثتی، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) دو ناهنجاری فامنتی (کروموزومی) ساختاری نام ببرید که در آن‌ها طول فامتن می‌تواند ثابت بماند. (ب) دو شاهد تغییر گونه‌ها را نام ببرید. (پ) برای وقوع گونه‌زایی دگرمهنه، کدام یک از عوامل برهم‌زننده تعادل ژنی متوقف می‌شود؟</p> <p>موفق باشد.</p>	۱/۲۵ (شهریور ۱۴۰۲)
		۲۰



ردیف	سوالات	رشته: علوم تجربی	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>(الف) قطر باکتری استریپتوكوکوس نومونیای پوشینه‌دار (کپسولدار)، بیشتر از ۲۰۰ نانومتر است. (ب) از نتایج آزمایش‌های گریفیت مشخص شد که باکتری بدون پوشینه با دریافت دنا از محیط خارجی، پوشینه‌دار شد. (شهریور ۱۴۰۲) (پ) هرگاه در دو ژن مجاور، رشتة‌های الگو متفاوت باشند، رتابسپارازها هنگام رونویسی آن دو ژن از هم دور می‌شوند. (ت) هنگام حضور لاکتوز در محیط باکتری <i>E. coli</i>، الاماً پروتئین مهارکننده از اپرатор جدا نمی‌شود. (ث) در علم زیست‌شناسی، به هر یک از ویژگی‌های یک جاندار، صفت می‌گویند. (ج) دو نوع کربوهیدرات، با حضور دو نوع ال (دگره) موجود در غشای گویچه‌های قرمز، تولید می‌شوند. (چ) عاملی که علت مقاوم شدن باکتری‌ها به پادزیست‌ها را توضیح می‌دهد، سبب کاهش توان بقای جمعیت می‌شود. (ح) هر جهش بزرگ ساختاری که تعداد ژن‌ها در آن ثابت بماند، با مشاهده کاریوتیپ قابل تشخیص است.</p>		۲

ردیف	نمره	سؤالات												
۲	۲	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر، جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.</p> <p>(الف) از آنزیم در صنعت برای کاغذسازی و تولید سوخت زیستی استفاده می‌شود.</p> <p>(ب) کاتالیزورهای زیستی، امکان برخورد مناسب مولکول‌ها را افزایش و انژی واکنش را کاهش می‌دهند.</p> <p>(پ) در فرایند ترجمه، اولین آمینواسید متیونین موجود در رشته پیتیدی در حال ساخت دارای گروه آزاد است. (شهریور۱۴۰۳)</p> <p>(ت) تنها بخشی از یاخته یوکاریوت که در آن امکان مشاهده همزمان رئاهای پیک بالغ و نابالغ وجود دارد. است.</p> <p>(ث) همه ذرت‌هایی که فقط دارای دو جایگاه ژنی ناخالص هستند، از ذرت‌های دارای عدد دگره بارز، فاصله یکسانی دارند.</p> <p>(ج) در فرد مبتلا به بیماری فنیل کتونوری، در اثر ایجاد ترکیبات خطرناک. آسیب می‌بیند.</p> <p>(چ) جهش بزرگ ساختاری از نوع در یک کروموزوم، طول آن را تغییر می‌دهد اما قطعاً هیچ تأثیری بر فامتن همتیا غیرهمتای آن ندارد.</p> <p>(ح) شکل روبه‌رو، در اثر که نوعی عامل جهش زای فیزیکی است ایجاد می‌شود.</p> 												
۳	۲	<p>برای کامل کردن هر یک از عبارت‌های زیر، از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) در ساختار دوم پروتئین‌ها، گروه (آمین - R) در تشکیل پیوند هیدروژنی بین آمینواسیدها شرکت می‌کند.</p> <p>(ب) بعضی آنزیم‌ها برای فعالیت به موادی مثل (یون آهن - ویتامین) نیاز دارند که به آن کوآنزیم گفته می‌شود.</p> <p>(پ) در فرایند ترجمه از روی اطلاعات (رنای پیک - رنای ناقل) برای ساخت پلی‌پیتید استفاده می‌شود.</p> <p>(ت) در تنظیم مثبت (همانند - برخلاف) تنظیم منفی رونویسی در E.coli. راه انداز در مجاورت ژن‌ها دیده می‌شود.</p> <p>(ث) (شایع‌ترین - تنها) نوع بیماری هموفیلی، مربوط به فقدان فاکتور انعقادی شماره VIII است.</p> <p>(ج) پسر مبتلا به نوعی بیماری وابسته به X بارز. (قطعاً - احتمالاً) مادرش هم به این بیماری مبتلاست.</p> <p>(چ) جهش مضاعف‌شدگی فقط در یاخته‌های (دولاد - تک‌لاد) صورت می‌گیرد.</p> <p>(ح) در صورت وقوع کراسینگ اوور، در هر تقسیم میوز حداکثر (چهار - دو) نوع گامت می‌تواند تولید شود.</p>												
۴	۰/۷۵	<p>در ارتباط با آزمایش‌های گرفیت و ایوری، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) در کدام مرحله از آزمایش ایوری، از گریزانه (سانتریفیوژ) استفاده شد؟</p> <p>(ب) کدام دانشمند، ماهیت ماده و راثتی را مشخص کرد؟</p> <p>(پ) در زمان ایوری، بسیاری از دانشمندان کدام ماده را ماده و راثتی می‌دانستند؟</p>												
۵	۰/۵	<p>درباره همانندسازی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) دوراهی همانندسازی در یاخته موش بیشتر است یا اشرشیاکلای؟</p> <p>(ب) در کدام بخش از یاخته انسان، قبل از همانندسازی، جداسازی هیستون‌ها از فامینه (کروماتین) دیده می‌شود؟</p>												
۶	۱/۲۵	<p>در ارتباط با شکل زیر که نوعی پروتئین در بدن انسان است، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) نام بخش شماره «۱» و «۲» را بنویسید.</p> <p>(ب) ساختار نهایی بخش «۳»، دارای کدام سطح ساختاری پروتئین‌هاست؟ چرا؟</p> <p>(پ) برای شناسایی ساختار آن و مشخص کردن جایگاه هر اتم، دانشمندان از تصاویر حاصل از چه پرتویی استفاده کردند؟</p> 												
۷	۱	<p>در جدول زیر، هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آن‌ها را پیدا کنید. (یکی از موارد ستون «ب» اضافی است)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ب</th> <th>الف</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱) دنا، بیش از یک رشته دارد.</td> <td>(الف) واتسون و کریک</td> </tr> <tr> <td>۲) دنا، دو رشته دارد.</td> <td>(ب) ویلکینز و فرانکلین</td> </tr> <tr> <td>۳) چگونگی انتقال دنا بین دو یاخته</td> <td>(پ) مزلسون و استال</td> </tr> <tr> <td>۴) استفاده از سزیم کلرید</td> <td>(ت) چارگاف</td> </tr> <tr> <td>۵) علت برابری مقدار A و T در دنا را نفهمید.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ب	الف	۱) دنا، بیش از یک رشته دارد.	(الف) واتسون و کریک	۲) دنا، دو رشته دارد.	(ب) ویلکینز و فرانکلین	۳) چگونگی انتقال دنا بین دو یاخته	(پ) مزلسون و استال	۴) استفاده از سزیم کلرید	(ت) چارگاف	۵) علت برابری مقدار A و T در دنا را نفهمید.	
ب	الف													
۱) دنا، بیش از یک رشته دارد.	(الف) واتسون و کریک													
۲) دنا، دو رشته دارد.	(ب) ویلکینز و فرانکلین													
۳) چگونگی انتقال دنا بین دو یاخته	(پ) مزلسون و استال													
۴) استفاده از سزیم کلرید	(ت) چارگاف													
۵) علت برابری مقدار A و T در دنا را نفهمید.														

ردیف	سوالات	نمره
۸	طبق متن کتاب درسی، بیماری کم خونی داسی شکل به نوعی ارتباط بین دو مولکول اطلاعاتی بدن را نشان می‌دهد. نام آن دو را بنویسید.	۰/۵
۹	با توجه به شکل که دو ژن متوالی در ساختار دنا را نشان می‌دهد، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) یک مثال از ژنی که در یاخته تازه تقسیم شده به این شکل دیده می‌شود، بنویسید. ب) در بخش مشخص شده با علامت سؤال، چند توالی راهانداز وجود دارد؟ پ) آیا این دو ژن، از روی رشته یکسانی از دنا رونویسی می‌شوند یا رشته متفاوتی از دنا؟ چرا؟ ت) در ژن سمت راست، حداکثر چند نوع رنابسپاراز می‌توانند در حال رونویسی از ژن باشند؟ ث) آیا رناهای قابل مشاهده در این شکل می‌توانند در مرحله آغاز رونویسی خود باشند؟ چرا؟	۱/۷۵
۱۰	در زیر، ترتیب وقایع مرحله آغاز ترجمه نوشته شده است. موارد خواسته شده را بنویسید. هدایت زیروحد کوچک رناتن (ریبوزوم) به سوی رمزه آغاز توسط ...!الف... ← اتصال رنای ناقل (tRNA) دارای آمینواسید ...!ب... در جایگاه P رناتن ← افزوده شدن زیروحد بزرگ رناتن به مجموعه ← کامل شدن ساختار رناتن (شهریور ۱۴۰۲)	۰/۵
۱۱	در ارتباط با ساختار رنای ناقل و رناتن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) آیا در مرکزی ترین بخش رنای ناقل در ساختار دو بعدی، پیوند هیدروژنی مشاهده می‌شود؟ ب) در مرحله پایان ترجمه، در کدام جایگاه یا جایگاه‌های رناتن، رنای ناقل مشاهده نمی‌شود؟	۰/۷۵
۱۲	مردی که دارای هر دو کربوهیدرات گروه خونی ولی فاقد پروتئین گروه خونی است، صاحب فرزندی دارای هر دو کربوهیدرات و دارای پروتئین گروه خونی شده است. الف) مادر خانواده قطعاً کدام فنوتیپ گروه خونی ABO را ندارد؟ ب) آیا این مرد می‌تواند صاحب فرزندی فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی شود؟ پ) ژنوتیپ یا ژنوتیپ‌های احتمالی مادر از نظر گروه خونی Rh را بنویسید.	۱
۱۳	تا قبل از مندل، چه تصوری برای صفات فرزندان و والدین وجود داشت؟	۰/۵
۱۴	در مورد انتقال اطلاعات در نسل‌ها، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) انواع ژن نمودهای مردان برای هموفیلی را بنویسید. ب) در مورد صفت رنگ نوعی ذرت، ژن نمود AAbbCC به رنگ قرمز نزدیک است یا سفید؟ (شهریور ۱۴۰۳)	۰/۷۵
۱۵	در ارتباط با صفت گروه خونی Rh، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) جایگاه ژن‌های آن، روی کدام کروموزوم انسان است؟ ب) مشخص کنید که این صفت گسیسته است یا پیوسته. چرا؟	۰/۷۵
۱۶	در صورتی که گویچه‌های قرمز پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکسیژن محیط داسی شکل شود، در یک منطقه مalariaخیز: (سراسری ۱۴۰۱) الف) آیا امکان تولد پسر مقاوم به مalaria وجود دارد؟ ب) آیا امکان تولد دختر در معرض خطر ابتلا به Malaria وجود دارد؟	۰/۵
۱۷	با توجه به شکل زیر که نوعی جهش را نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید. دانای پیک بروتوپین پایان TAC T CAA AAC C G ATT ATG AAG T T T G G C T AA A U G A A G U U U G G C U A A Met Lys Phe Gly → TAC A T CAA AAC C G ATT ATG T A G T T T G G C T AA A U G U A G U U U G G U U A A Met پایان الف) چه نوع جهش جانشینی روی داده است؟ چرا؟ ب) آیا تغییر چارچوب خواندن روی داده است؟	۰/۷۵

ردیف	سوالات	نمره
۱۸	در یک سلول با ژنتیپ $HhDd$, در صورت وقوع کراسینگ اوور, انواع گامت‌های والدی و نوترکیب را مشخص کنید. (در صورتی که دگرهای D و h روی یک کروموزوم باشند)	۱
۱۹	در ارتباط با علت جهش، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) در چه صورت، همه یاخته‌های حاصل از تقسیم یاخته تخم دارای جهش خواهد بود؟ ب) ماده شیمیابی جهش‌زای موجود در دود سیگار که سبب سرطان می‌شود را نام ببرید. پ) وجود چه ماده‌ای در سوسیس و کالباس سبب ماندگاری آن‌ها می‌شود؟	۰/۷۵
۲۰	در ارتباط با تغییر گونه‌ها و عوامل برهم‌زننده تعادل جمعیت، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) در کدام نوع گونه‌زایی، شارش ژن متوقف نمی‌شود؟ ب) دو عامل برهم‌زننده تعادل را که در گونه‌زایی دگرمهنه در جمعیت‌های بسیار بزرگ تأثیر زیادی دارند، نام ببرید. پ) گل مغربی III . کدام ویژگی گونه را از نظر ارنست مایر، ندارد؟	۱
	موفق باشید.	۲۰



موضوع آزمون

۱۵۲ تا ۱۵۴

نیمسال اول (۲۰۲۳)

صفحات پاسخ

۱۵۲ تا ۱۵۴

امتحان نهایی: زیست‌شناسی ۳

ردیف	سوالات	نمره	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه		تألیفی	رشته: علوم تجربی
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. الف) هر چه غلطیت پیش‌ماده در محیط دارای آنزیم افزایش یابد، سرعت واکنش نیز افزایش می‌یابد. ب) هر نوکلئوتید موجود در بدنهای فرد سالم، از طریق نوعی پیوند اشتراکی به نوکلئوتید دیگری متصل شده است. پ) در فرایند ترجمه، هر سه جایگاه رناتن (ریبوزوم)، می‌توانند محل خروج tRNA (رنای ناقل) از رناتن باشند. ت) در شکل روبرو، همه پروتئین‌های در حال ساخت در نهایت از یک نوع و یک اندازه خواهند بود. ث) در یک مرد درگیر با فقدان عامل انعقادی هشت، قطعاً بر روی نوعی فامتن جنسی، دگرهای (الی) نهفته وجود دارد. (دی ۱۴۰۳) ج) اگر هر چهار فنوتیپ گروه خونی ABO و هر دو نوع فنوتیپ گروه خونی Rh در بین فرزندان یک زوج محتمل باشد، قطعاً هر دو از نظر هر دو صفت ناخالص هستند. ج) اگر جهش در ژن آنزیمی در جایی دور از جایگاه فعلی رخ دهد، احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است. (دی ۱۴۰۳) ح) دوپار (دیمر) تیمین، سبب اختلال در عملکرد آنزیمی می‌شود که در ویرایش، پیوند هیدروژنی و فسفودی استر را می‌شکند.	۲				
۲	در هر یک از عبارت‌های زیر، جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. الف) ژن افزایش مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک (پادزیست)، روی باکتری قرار دارد. ب) هنگام تشکیل پیوند بیتیدی، گروه آمینو اسید، تعداد اتم‌های بیشتری از دست می‌دهد. پ) به هم پیوستن مجدد دو رشته دنا، در مراحل پایان و رونویسی دیده می‌شود. ت) نقش پروتئین فعلی کننده در E.coli. مشابه نقش پروتئین‌های در یوکاریوت‌هاست. ث) اگر گل میمونی دارای ال (دگره) R در یکی از فامتن‌هایش باشد، ممکن نیست به رنگ دیده شود. (خرداد ۱۴۰۳) ج) اگر مرد دارای گروه خونی A، صاحب فرزندی با گروه خونی A یا شود، نمی‌توان ژنتیک مرد را با قاطعیت مشخص کرد. ج) در فرایند کراسینگ اوور، قطعه‌ای از فامتن میان فامینک‌های (کروماتیدهای) دو کروموزوم همتا مبادله می‌شود. ح) اگر در گیاه گل مغربی $=2n=4n$, جدا نشدن کروموزوم‌ها در میوز ۱ روی دهد، گامت‌های حاصل حداقل عدد کروموزوم خواهند داشت.	۲				


ردیف	سوالات	نمره
۹	در ارتباط با خفash‌های خون‌آشام به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) به صورت گروهی در چه جاهایی زندگی می‌کنند؟ (دو مورد) ب) نحوه اشتراک غذای آن‌ها با یکدیگر چگونه است؟ پ) برای بروز رفتار دگرخواهی آن‌ها، تشکیل چه چیزی الزامی است؟	۱/۲۵
۱۰	با توجه به پرندگان یاریگر، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) تفاوت اصلی نتیجه دگرخواهی در این جانوران با دگرخواهی در زنبور عسل کارگر چیست؟ ب) در چه شرایطی، قلمرو جفت‌های زادآور را تصاحب می‌کنند؟ پ) تجربه‌ای که کسب می‌کنند، چه سودی برای آن‌ها دارد؟ (دو مورد)	۱
۱۱	دو بخش از گل که توسط زنبور یابنده به کندو آورده می‌شود را نام ببرید.	۰/۵
۱۲	آیا در جمعیتی که رفتار دگرخواهی مشاهده می‌شود، تعادل در جمعیت می‌تواند برقرار بماند؟ چرا؟	۰/۵
	موفق باشید.	۱۰



درود پر تو که ۳۰ (اینچه) امدمی چلو! قل از پررسی آزمون‌های چامع شیوه‌ساز‌نها بیانیم سال دوم رو با هم مرور کنیم.

ردیف	سوالات	رشته: علوم تجربی	تألیفی	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه	امتحان نهایی: زیست‌شناسی ۳
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. الف) در گلیکولیز همانند چرخه کالوین، تولید و مصرف ترکیب سه کربنی تک فسفاته دیده می‌شود. ب) در زنجیره انتقال الکترون راکیزه (میتوکندری)، تولید ATP و آب، در بخش داخلی صورت می‌گیرد. پ) هر گیاهی که تثبیت کربن آن تقسیم‌بندی مکانی دارد، هر دو مرحله تثبیت کربن را در روز انجام می‌دهد. ت) در نوعی جاندار که می‌تواند با جذب CO ₂ ، گازی بی‌رنگ با بویی شبیه تخم مرغ گندیده را تجزیه کند، رونوشت اینترон‌ها در رنای پیک حذف می‌شود. ث) دوره زیست‌فناوری نوبن، با کشت ریز جانداران (میکروارگانیسم‌ها) آغاز شد. ج) جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده، می‌تواند شامل ۱۰ عدد نوکلئوتید باشد. چ) در زندگی گروهی، امکان شکار شدن جانور به علت وجود نگهبان‌های گروه کمتر است. ح) شکل روبرو، نشان دهنده برقراری ارتباط بین تجربه‌های گذشته و موقعیت جدید است.	(شنبه‌یور ۱۴۰۲)	(خرداد ۱۴۰۲)	۲	
۲	در هر یک از عبارت‌های زیر، جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. الف) مقدار ATP تولید شده به ازای تجزیه کامل گلوكز در بهترین شرایط در یاخته یوکاریوت، حداقل عدد است. ب) در تخمیر، آخرین پذیرنده الکترون نوعی ماده آلی سه کربنی است. پ) فتوسیستم ۱ در زنجیره انتقال الکترون غشای تیلاکوئید، الکترون‌ها را به سطح غشای تیلاکوئید می‌فرستد. ت) تنها رنگیزه فتوسنتزی که در طول موج‌های کمتر از ۴۰۰ نانومتر هم جذب دارد. است. ث) در تولید شوینده‌ها، آنزیم پایدار در برابر گرما به نام استفاده می‌شود. ج) در ساختار مولکول پیش‌انسولین، بلندترین زنجیره، زنجیره است. چ) مهاجرت سارها، نشان می‌دهد که رفتار مهاجرت رفتاری غریزی است که نیز در آن نقش دارد. ح) در نظام جفت‌گیری، جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند.	(خرداد ۱۴۰۲)	(شنبه‌یور ۱۴۰۲)	۲	


ردیف	نمره	سؤالات
۳	۲	<p>برای کامل کردن هر یک از عبارت‌های زیر، از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) در یک تار ماهیچه‌ای، انواع مولکول‌های ناقل الکترون موجود در زنجیره، در کاهش pH فضای بین دو غشای راکیزه سهم (یکسانی - متفاوتی) دارند.</p> <p>(ب) در غشای داخلی میتوکندری، آنزیم سازنده ATP-FAD^+، جزو پروتئین‌های زنجیره انتقال الکترون نیست.</p> <p>(پ) واکنش بازسازی ترکیب آغازگر چرخه در چرخه کالوین، نوعی واکنش (انرژی‌زا - انرژی‌خواه) است.</p> <p>(ت) در چرخه کالوین، CO_2 با قندی (پنج کربنی دو فسفاته - پنج کربنی تک فسفاته) ترکیب می‌شود.</p> <p>(ث) زنجیره B پیش انسولین، از طریق گروه (آمین - کربوکسیل) خود به زنجیره C متصل است.</p> <p>(ج) در مرحله دوم (همانند - برخلاف) مرحله چهارم همسانه‌سازی دنا، تشکیل پیوند فسفودی‌استر دیده می‌شود.</p> <p>(چ) در رفتار دگرخواهی (خفاش‌های خون‌آشام - دم‌عصایی)، جانوران با یکدیگر گروه همکاری تشکیل می‌دهند.</p> <p>(ح) نقش پذیری جوجه غازها، طی (چند ساعت - چند روز) پس از خروج از تخم رخ می‌دهد.</p>
۴	۰/۷۵	<p>در ارتباط با شکل رویه رو که پس از ورود محصول نهایی گلیکولیز به میتوکندری روی می‌دهد، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) نام این فرایند را بنویسید.</p> <p>(ب) به ازای تولید هر مولکول «۱» در گام آخر گلیکولیز، چند ATP تولید می‌شود؟</p> <p>(پ) مولکول «۲»، برای ورود به چرخه کربس ابتدا باید به چه مولکولی متصل شود؟</p>
۵	۰/۷۵	چرا تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه‌های اسکلتی و سیستم ایمنی از عوارض سوء تغذیه و فقر غذایی شدید است؟
۶	۰/۷۵	<p>با توجه به «زیستن مستقل از اکسیژن» به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) چه فرایندی، مرحله مشترک بین تنفس هوایی و بیهوایی است؟</p> <p>(ب) واکنش تولید اتانول در تخمیر الکلی، از نوع اکسایش است یا کاهش؟</p> <p>(پ) کدام نوع تخمیر در تولید خیارشور استفاده می‌شود؟</p>
۷	۱/۲۵	<p>در رابطه با تنفس یاخته‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) محل تشکیل FADH_2، در کدام قسمت راکیزه (میتوکندری) است؟</p> <p>(ب) آنزیم ATP ساز، انرژی مورد نیاز برای ترکیب ADP و گروه فسفات را چگونه فراهم می‌کند؟</p> <p>(پ) در تخمیر، برای تداوم گلیکولیز (قدکافت) بازسازی چه مولکولی ضروری است؟</p> <p>(ت) دود خارج شده از خودروها حاوی چه گازی است که باعث می‌شود ظرفیت حمل اکسیژن در خون کاهش یابد؟</p>
۸	۱/۲۵	<p>در ارتباط با کلروپلاست، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) آیا یون H^+ می‌تواند بدون عبور از غشا، از یک تیلاکوئید به یک تیلاکوئید دیگر منتقل شود؟ چرا؟</p> <p>(ب) در محدوده طول موج ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر، حداکثر میزان جذب کدام رنگیزه از بقیه کمتر است؟</p> <p>(پ) به غیر از تجزیه نوری آب و عملکرد پمپ پروتونی، یک عامل دیگر نام ببرید که سبب ایجاد شیب غلظت پروتون از تیلاکوئید به سمت بستره می‌شود.</p> <p>(ت) در کلروپلاست، کدام روش ساخت مولکول ATP مشاهده می‌شود؟</p>
۹	۱	<p>در ارتباط با چرخه کالوین، به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) به ازای تولید هر قند سه کربنی تک فسفات، چند یون فسفات از چرخه خارج می‌شود؟</p> <p>(ب) در یک چرخه کالوین، تعداد ATP مصرف شده بیشتر است یا تعداد NADPH مصرف شده؟</p> <p>(پ) توضیح دهید که چرا مولکول ۶ کربنی، به سرعت تجزیه می‌شود و به چه مولکولی تبدیل می‌شود؟</p>
۱۰	۰/۷۵	توضیح دهید که چرا دما بر فتوسنتر اثر می‌گذارد.
۱۱	۰/۵	<p>مشخص کنید که هر یک از جملات زیر مربوط به چه نوع گیاهی است. (C_4 یا C_3)</p> <p>(الف) در واکوئل‌های خود ترکیباتی دارند که آب را نگه می‌دارند.</p> <p>(ب) مولکول ۶ کربنی حاصل از مرحله اول ثبت آنها، از پلاسمودسیم عبور نمی‌کند.</p>

ردیف	سوالات	نمره														
۱۲	در زیر، جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده‌ای نشان داده شده است. توالی انتهای چسبنده آن را مشخص کنید. (محل برش پیوند فسفودی استر بین A و G) GCAGCTGC CGTCGACG (خرداد ۱۴۰۲)	۰/۵														
۱۳	در ارتباط با مهندسی ژنتیک، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) کاربرد اصلی و طبیعی آنزیم برش دهنده در باکتری‌ها چیست؟ ب) طبق کتاب درسی، نام سه آنزیمی را که توانایی ایجاد پیوند فسفودی استر دارند بنویسید.	۱														
۱۴	درباره مولکول پلاسمین به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) به طور طبیعی در بدن چه وظیفه‌ای را انجام می‌دهد؟ ب) در مهندسی پروتئین، چه تعداد از آمینواسیدهای آن را تغییر می‌دهیم؟ پ) تغییرات پلاسمین در مهندسی پروتئین، چه تأثیری بر این مولکول می‌گذارد؟ (دو مورد)	۱														
۱۵	در چه شرایطی، برای شخصی که دچار سوتگی وسیع شده است، بهترین راه کشت بافت و پیوند پوست است؟ (دو مورد)	۰/۵														
۱۶	با توجه به شکل رویه‌رو که نوعی از ویروس‌ها را نشان می‌دهد، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) این ویروس، از خانواده کدام ویروس‌هاست؟ ب) با استفاده از چه علمی، ساخت واکسن آن به سرعت انجام شد؟ 	۰/۵														
۱۷	در زیر، مراحل لازم جهت بروز رفتار مراقبت موش مادر از فرزندان نوشته شده است. به جای «الف» و «ب» عبارت مناسب را بنویسید. وارسی نوزادان توسط موش مادر ← ← ← «الف» ← ← فعال شدن ژن B در یاخته‌هایی در مغز موش مادر ← ← «ب» ← ← فعال شدن آنزیم‌ها و پروتئین‌های دیگر ← ← به راه افتادن فرایندهای پیچیده ← ← ← بروز رفتار مراقبت مادری (خرداد ۱۴۰۲)	۰/۵														
۱۸	در ستون «ب» جدول زیر، توضیحاتی درباره انتخاب طبیعی و رفتار بیان شده است. هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آن‌ها را پیدا کنید. (یکی از موارد ستون «ب» اضافی است) <table border="1" data-bbox="430 1302 1227 1673"> <tr> <td style="text-align: center;">ب</td> <td style="text-align: center;">الف</td> </tr> <tr> <td>۱) حمله به جانوران دیگر برای بیرون راندن مزاحم</td> <td>الف) زادآوری</td> </tr> <tr> <td>۲) انتخاب صدف‌هایی با اندازه متوسط توسط خرچنگ‌های ساحلی</td> <td>ب) غذایابی</td> </tr> <tr> <td>۳) ذخیره چربی به مقدار کافی</td> <td>پ) قلمروخواهی</td> </tr> <tr> <td>۴) بیرون اندختن پوسته‌های تخم توسط پرنده کاکایی</td> <td>ت) مهاجرت</td> </tr> <tr> <td>۵) پرهای زینتی دم طاووس نر</td> <td>ث) خواب زمستانی</td> </tr> <tr> <td>۶) استفاده از نشانه‌های محیطی برای جهت‌یابی</td> <td></td> </tr> </table>	ب	الف	۱) حمله به جانوران دیگر برای بیرون راندن مزاحم	الف) زادآوری	۲) انتخاب صدف‌هایی با اندازه متوسط توسط خرچنگ‌های ساحلی	ب) غذایابی	۳) ذخیره چربی به مقدار کافی	پ) قلمروخواهی	۴) بیرون اندختن پوسته‌های تخم توسط پرنده کاکایی	ت) مهاجرت	۵) پرهای زینتی دم طاووس نر	ث) خواب زمستانی	۶) استفاده از نشانه‌های محیطی برای جهت‌یابی		۱/۲۵
ب	الف															
۱) حمله به جانوران دیگر برای بیرون راندن مزاحم	الف) زادآوری															
۲) انتخاب صدف‌هایی با اندازه متوسط توسط خرچنگ‌های ساحلی	ب) غذایابی															
۳) ذخیره چربی به مقدار کافی	پ) قلمروخواهی															
۴) بیرون اندختن پوسته‌های تخم توسط پرنده کاکایی	ت) مهاجرت															
۵) پرهای زینتی دم طاووس نر	ث) خواب زمستانی															
۶) استفاده از نشانه‌های محیطی برای جهت‌یابی																
۱۹	با توجه به کتاب درسی، مشخص کنید هر یک از رفتارهای زیر، کدام نوع یادگیری را نشان می‌دهد. الف) ترشح شدن بزرگ سگ پاولوف در پاسخ به صدای زنگ ب) عدم واکنش کلاغ‌ها به مترسک پ) امتناع پرنده از خوردن دوباره پروانه مونارک	۰/۷۵														
۲۰	در ارتباط با علم رفتارشناسی، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) پژوهشگران برای بررسی چگونگی انجام رفتار در یک جانور، چه مواردی را بررسی می‌کنند؟ (دو مورد) ب) چگونه جیرجیرک نر مطرح شده در کتاب درسی، هزینه بیشتری در تولیدمثل می‌پردازد؟	۱														
	موفق باشد.	۲۰														

ردیف	سوالات	نمره
۲۲	با توجه به شکل مقابل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) این جانور، در حال دریافت کیسه است یا در حال انتقال آن به جنس دیگر؟ ب) آیا جانور موجود در این شکل، برای انتخاب شدن با هم جنس‌های خود رقابت می‌کند؟	۰/۵
۲۳	با توجه به رفتارهای جانوران، به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) طولانی‌تر بودن حرکات زنبور یابنده، چه چیزی را نشان می‌دهد؟ ب) یک مورد از فواید قلمرو اختصاصی را برای جانور بنویسید. پ) طبق کتاب درسی، کدام گروه از مهره‌داران، اغلب نظام جفت‌گیری چندهمسری دارند؟	۰/۷۵
۲۴	اگر خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفash دگرخواه را جبران نکند، چه نتیجه‌ای برای او در پی دارد؟	۰/۵
	موفق باشید.	۲۰




ردیف	سوالات	رشته: علوم تجربی	تألیفی	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. الف) هر آنژیمی که توانایی شکستن پیوند فسفودی استر را دارد، توانایی تشکیل این پیوند را نیز دارد. ب) هنگام ترجمه، پس از استقرار سومین رنای ناقل در جایگاه A ریبوزوم، رناتن برای دومین بار به اندازه یک کدون جابه‌جا می‌شود. پ) در یک صفت، ممکن است تعداد انواع فنوتیپ‌ها (رخ‌نمودها) بیشتر از انواع ژنتوتیپ‌ها (ژن‌نمودها) برای آن صفت باشد. ت) هر جهش بزرگ ساختاری که در آن طول کروموزوم ثابت بماند، می‌تواند بر تغییر محل سانترومر کروموزوم بی‌تأثیر باشد. ث) هر مولکول پیررووات پس از ورود به میتوکندری، ابتدا دو الکترون و سپس یک کربن از دست می‌دهد. ج) بزرگ‌ترین پروتئین زنجیره کوتاهتر تیلاکوئید، سبب انجام نوعی واکنش کاهشی در سطح خارجی غشای تیلاکوئید می‌شود. چ) در مهندسی بافت، همواره از باخته‌های بنیادی برای تکثیر و تولید بافت‌های مختلف استفاده می‌شود. ح) در بروز همه انواع یادگیری، کسب تجربه الزامی است.	۲		
۲	در هر یک از عبارت‌های زیر، جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. الف) مایه پنیر را به طور سنتی از نوزادان جانورانی مانند گاو و گوسفند به دست می‌آورند. ب) عوامل رونویسی متصل به افزاینده، به دنبال ایجاد در دنا، در کنار عوامل رونویسی متصل به راه‌انداز قرار می‌گیرند. پ) بین الـهـاـی مربوط به صفت رنـگ گـل مـیـمـونـی، رـابـطـه بـرـقـارـاست. ت) در یک مرد دارای گروه خونی A ناخالص و Rh ناخالص، با توجه به آرایش مختلف کروموزوم‌ها در متافاز ۱ و با صرف نظر از کراسینگ اوور، حداقل نوع گامت از نظر این دو صفت در هر میوز تولید می‌شود. ث) فراورده نهایی تخمیری که در آن، ترکیب دو کربنی الکترون گیری می‌کند، با آسیب به راکیزه سبب نکروز کند می‌شود. ج) جاندار شکل مقابل، نام دارد که از آغازیان فتوسنترزکننده است. چ) دلیل کاهش فعالیت اینترفرون تولیدی در مهندسی ژنتیک، تشکیل پیوندهای نادرست هنگام ساخته شدن آن در است. ح) داشتن بیشترین تعداد معیاری برای موقوفیت زادآوری در جانوران است.	۲		

ردیف	نمره	سؤالات						
۳	۲	<p>برای کامل کردن هر یک از عبارت‌های زیر، از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) در ساختار دوم (همانند - برخلاف) ساختار چهارم پروتئین‌ها، پیوندگاری هیدروژنی قابل مشاهده‌اند.</p> <p>(ب) در یوکاریوت‌ها اگر بین دو راه انداز متواالی، بیش از یک ژن دیده شود، جهت رونویسی آن دو ژن (یکسان - متفاوت) است.</p> <p>(پ) اگر یک مرد ناخالص از نظر گروه خونی Rh، تواند هیچ فرزند دارای گروه خونی منفی داشته باشد، قطعاً همسر وی از نظر این صفت (خالص بارز - خالص نهفته) است.</p> <p>(ت) فردی که به دلیل ناهنجاری عددی، یک کروموزوم ۱۸ اضافی دارد، در زنوم خود دارای (سه - یک) عدد کروموزوم ۱۸ است.</p> <p>(ث) روش ساخت ATP به کمک کراتین فسفات، همانند روش ساخت ATP در (ماده زمینه سیتوپلاسم - غشاء داخلی میتوکندری) در فرایند تنفس یاخته‌ای است.</p> <p>(ج) سیانوباكتری‌ها، نوعی از کلروفیل را دارند که حداقل جذب آن در بازه طول موج (۴۰۰ تا ۵۰۰ - ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر) از کلروفیل نوع دیگر بیشتر است.</p> <p>(چ) در پیش‌انسولین، زنجیره دارای خمیدگی از سمت گروه (آمین - کربوکسیل) خود به اولین زنجیره ترجمه شده متصل است.</p> <p>(ح) جانور میزبان خفاش خون‌آشام، به گروهی از مهره‌داران تعلق دارد که بیشتر آن‌ها نظام جفت‌گیری (چندهمسری - تک‌همسری) دارند.</p>						
۴	۰/۷۵	<p>با توجه به مدل واتسون و کریک برای مولکول DNA، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) ثابت بودن قطر مولکول دنا در سراسر آن، چه مزیتی دارد؟</p> <p>(ب) پیوند فسفودی‌استر بین کدام دو بخش دو نوکلئوتید مجاور دیده می‌شود؟</p>						
۵	۰/۵	<p>اگر یک مولکول DNA اولیه شامل نوکلئوتیدهای سبک، در محیط دارای نوکلئوتیدهای سنگین سه نسل همانندسازی حفاظتی انجام دهد و سپس دنایی حاصل سانتریفیوژ شوند:</p> <p>(الف) چند نوار در لوله آزمایش قابل مشاهده است؟</p> <p>(ب) پایین‌ترین نوار موجود در لوله، شامل چند مولکول DNA است؟</p>						
۶	۰/۵	چرا یاخته‌ها به مقدار کم به آنزیم‌ها نیاز دارند؟						
۷	۱/۲۵	<p>شکل مقابل، نوعی رنای ناقل را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) توالی ۳، به کدام گروه آمینواسید متصل می‌شود؟</p> <p>(ب) بازهای آنی نوکلئوتیدهای توالی ۲، به سمت داخل مولکول قرار دارند یا به سمت خارج مولکول؟</p> <p>(پ) آیا در ساختار دو بعدی این مولکول، در مرکزی‌ترین بخش، پیوند شماره ۱ مشاهده می‌شود؟</p> <p>(ت) از بین توالی‌های ۲ و ۳، کدام یک در همه انواع رنایهای ناقل یکسان است؟</p> <p>(ث) در ترجمه، هنگامی که توالی ۳ به آمینواسید متصل نیست، این مولکول قطعاً از طریق کدام جایگاه از ریبوزوم خارج نمی‌شود؟</p> 						
۸	۰/۵	<p>با استفاده از دو کلمه «قدن» و «پروتئین»، نمودار مفهومی زیر را در ارتباط با تنظیم مثبت رونویسی در E.coli کامل کنید.</p> <p>پیوستن ... (الف)... به پروتئین —————→ پیوستن پروتئین به ... (ب)... —————→ (ب)</p>						
۹	۰/۵	<p>در یک خانواده، پدر و مادر هر دو سالم هستند. همچنین، پدر فاقد کربوهیدرات‌های گروه خونی است و مادر گروه خونی A دارد. اگر فرزند اول مبتلا به کم‌خونی داسی‌شکل شود، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) آیا پدر و مادر نسبت به مalaria مقاوم‌اند؟</p> <p>(ب) در چه صورت امکان ندارد گروه خونی فرزند، O شود؟</p>						
۱۰	۰/۷۵	<p>ژنوتیپ‌های زیر، مربوط به نوعی ذرت کتاب درسی است. با توجه به آن‌ها به سؤالات زیر پاسخ دهید.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>AABBCC (۳)</td> <td>aaBBCc (۲)</td> <td>AaBbcc (۱)</td> </tr> <tr> <td>AABbCc (۵)</td> <td>aabbCc (۴)</td> <td></td> </tr> </table> <p>(الف) ذرت‌های حاصل از آمیزش ذرت‌های ۱ و ۳، در چند ستون مختلف فراوانی ذرت کتاب درسی می‌توانند قرار گیرند؟</p> <p>(ب) کدام دو ذرت، طبق نمودار کتاب درسی، مربوط به فنوتیپ‌هایی هستند که فراوانی برابر دارند؟</p>	AABBCC (۳)	aaBBCc (۲)	AaBbcc (۱)	AABbCc (۵)	aabbCc (۴)	
AABBCC (۳)	aaBBCc (۲)	AaBbcc (۱)						
AABbCc (۵)	aabbCc (۴)							
۱۱	۰/۵	<p>در یک خانواده، پدر و مادر هر دو مبتلا به نوعی بیماری ژنتیکی وابسته به X هستند اما فرزند اول آن‌ها سالم شده است.</p> <p>(الف) جنسیت فرزند اول را مشخص کنید.</p> <p>(ب) اگر فرزند اول در آینده ازدواج کند، می‌تواند دارای دختری بیمار شود؟</p>						


ردیف	سوالات	نمره								
۱۲	<p>با توجه به «تغییر در اطلاعات و راثتی» به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) در صورت تغییر رمز گلوباتامیک اسید به والین، تعداد پیوندهای هیدروژنی ژن بتای هموگلوبین چه تغییری می‌کند؟</p> <p>(ب) اگر در یک ژن پروتئین‌ساز، نوعی جهش کوچک روی دهد، مشخص کنید کدام مورد زیر قطعاً تغییر می‌کند:</p> <p>(۱) مولکول حاصل از رونویسی (۲) در نوعی گونه‌زایی که همراه با توقف شارش است، اثر کدام عامل برهم‌زننده تعادل را فقط در شرایط خاصی باید در نظر گرفت؟ (ت) مشاهدات هوگو دوری، در ارتباط با کدام نوع گونه‌زایی است؟</p>	۱								
۱۳	<p>فردي با ژنتيپ AaBb، با فريدي با همين ژنتيپ ازدواج مي‌کند. در صورت وقوع كراسينگ اوور در فرد اول، دو مثال از ژنتيپ فرزندان حاصل از گامت نوترکيب آن‌ها را مشخص کنيد. (دگرهای A و B روی يك كروموزوم هستند)</p>	۰/۵								
۱۴	<p>ساخترهایی که در یک عدد از افراد جمعیت بسیار کارآمد هستند اما در عده دیگر کوچک یا ساده شده و یا فاقد کار خاصی‌اند، چه نامیده می‌شوند؟</p>	۰/۲۵								
۱۵	<p>با توجه به شکل مقابل که زنجیره انتقال الکترون میتوکندری را نشان می‌دهد، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) از کدام پروتئین یا پروتئین‌ها، فقط الکترون‌های یک نوع ناقل الکترونی عبور می‌کند؟</p> <p>(ب) کدام پروتئین یا پروتئین‌ها توسط گاز کربن‌مونوکسید می‌توانند مهار شوند؟</p> <p>(پ) کدام پروتئین یا پروتئین‌ها، توانایی تجزیه ناقل الکترونی را دارد که در مراحل بیشتری از تنفس تولید می‌شود؟</p>	۰/۷۵								
۱۶	<p>به ازاي مصرف يك قند سه کربني تک فسفاته در گلیکولیز، تعداد موارد خواسته شده را مشخص کنيد.</p> <p>(الف) CO_2 تولیدی در چرخه کربس (پ) ADP مصرف شده در گلیکولیز</p>	۰/۷۵								
۱۷	<p>چرخه کربس، سبب اکسایش استیل کوآنزیم A می‌شود یا کاهش آن؟</p>	۰/۲۵								
۱۸	<p>با توجه به سه گیاه رز، ذرت و آناناس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) کدام گیاه یا گیاهان، ثبیت کربن را فقط در روز انجام می‌دهند؟</p> <p>(پ) کدام گیاه یا گیاهان، ساقه یا برگ گوشتشی و برآب دارند؟</p>	۰/۷۵								
۱۹	<p>جدول زیر در ارتباط با جانداران تولیدکننده مختلف است. هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آن‌ها را پیدا کنید. (یکی از موارد ستون «ب» اضافی است)</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">ب</td> <td style="text-align: center;">الف</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۱) ثبیت کربن بدون نور خورشید</td> <td style="text-align: center;">الف) باکتری نیترات‌ساز</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲) ثبیت نیتروژن بدون نور خورشید</td> <td style="text-align: center;">ب) باکتری مورد استفاده در تصفیه فاضلاب</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳) ثبیت کربن همراه با تولید آب</td> <td></td> </tr> </table>	ب	الف	۱) ثبیت کربن بدون نور خورشید	الف) باکتری نیترات‌ساز	۲) ثبیت نیتروژن بدون نور خورشید	ب) باکتری مورد استفاده در تصفیه فاضلاب	۳) ثبیت کربن همراه با تولید آب		۰/۵
ب	الف									
۱) ثبیت کربن بدون نور خورشید	الف) باکتری نیترات‌ساز									
۲) ثبیت نیتروژن بدون نور خورشید	ب) باکتری مورد استفاده در تصفیه فاضلاب									
۳) ثبیت کربن همراه با تولید آب										
۲۰	<p>با توجه به چرخه کالوین، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) اسید سه کربنی ابتدا فسفات می‌گیرد یا ابتدا فسفات از دست می‌دهد؟</p> <p>(پ) به ازاي توليد يك مولکول گلوكز، در واکشن تبديل قندهای سه کربنی به ريبولوزفسفات، چند گروه فسفات از چرخه خارج می‌شوند؟</p>	۰/۵								
۲۱	<p>امروزه چگونه به کمک روش‌های زیست‌فناوری، تولید پلاستیک‌های قابل تجزیه زیستی ممکن شده است؟</p>	۰/۷۵								
۲۲	<p>با توجه به زیست‌فناوری، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) تولید آنزیم‌ها، اولین بار در کدام دوره زیست‌فناوری ممکن شد؟</p> <p>(ب) در مراحل تولید گیاه تراژن، بلافارسله پس از تعیین صفت یا صفات مطلوب، چه مرحله‌ای باید انجام شود؟</p> <p>(پ) در ساخت واکسن به روش مهندسی ژنتیک، ژن مربوط به کدام قسمت عامل بیماری‌زا را باید منتقل کرد؟</p> <p>(ت) به جز پازمید، از چه عامل دیگری به عنوان ناقل ژن می‌توان در مهندسی ژنتیک استفاده کرد؟</p>	۱								

۷ **الف** **A** (۰/۱۵) (۳۰°) کدون آغاز، هرگز وارد جایگاه **A** ریبوزوم نمی‌شود زیرا از همان اول در جایگاه **P** مستقر است. **ب** عوامل آزادکننده (۰/۲۵) (۳۰°) در مرحله پایان ترجمه، عوامل آزاد کننده وارد جایگاه **A** ریبوزوم شده و سبب می‌شوند پلی‌پیتید از آخرين رنای ناقل جدا شود. **ت** پادرمزه (آنتی‌کدون) (۰/۲۵) (۳۰°) در یاخته‌ها، آنزیم‌های ویژه‌ای وجود دارند که بر اساس توالی پادرمزه، آمینواسید مناسب را به رنای ناقل متصل می‌کنند.

۸ **الف** نمی‌کنند (۰/۱۵) (۳۰°) طبق شکل، پروتئین‌هایی که به میتوکندری فرستاده می‌شوند از شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلزی عبور نمی‌کنند.



ب قبل (۰/۱۵) (۳۰°) با توجه به مقاهم ترجمه، ابتدا اولین پیوند پیتیدی تشکیل می‌شود و سپس اولین حرکت ریبوزوم روی می‌دهد. **پ** سومین (۰/۱۵) (۳۰°) هنگامی که چهارمین رنای ناقل در جایگاه **A** مستقر می‌شود، بالا فاصله بعد از آن سومین پیوند پیتیدی شکل می‌گیرد و ریبوزوم برای سومین بار به اندازه یک کدون جایه‌جا می‌شود. **ت** کربوکسیلی (۰/۱۵) (۳۰°) دقت کنید که سر آمینی (ابتدا) رشته پیتیدی از ساختار رناتن بیرون می‌زند و سر کربوکسیلی آن به رنای ناقل متصل است.



۹ **الف** زیرا طول عمر رنای پیک در این یاخته‌ها کم است. **ب** (۰/۱۵) (۳۰°)

۱۰ **الف**: اتصال زیر واحد کوچک رناتن به رنای پیک (۰/۱۵) (۳۰°) **دوم**: اتصال رنای ناقل حامل متیونین به رمز آغاز (۰/۱۵) (۳۰°) **سوم**: کامل شدن ساختار ریبوزوم (۰/۱۵) (۳۰°)

۱۱ **الف** شماره ۱ (۰/۱۵) (۳۰° و ۳۲) با توجه به جهت حرکت رنابسپاراز در شکل که از چپ به راست است، پس راه انداز در سمت (۱) است.

ب **A** (۰/۱۵) (۳۰° و ۳۲) زیرا طول پلی‌پیتید حاصل از ترجمه آن از بقیه بلندتر است. **پ** راکیزه (میتوکندری) (به بخش «سیتوپلاسم» هم نمره تعلق بگیرد) (به پاسخ «این فرایند در هیچ یک از بخش‌های یاخته می‌باشد بدن انسان وجود ندارد / اتفاق نمی‌افتد» نمره تعلق می‌گیرد) (۰/۱۵) (۳۰° و ۳۲) دقت کنید که طبق متن کتاب درسی، شروع ترجمه پیش از پایان رونویسی ویژه پروکاریوت‌هاست و در یاخته‌های یوکاریوتی دیده نمی‌شود اما کلید اولیه امتحان نهایی، «میتوکندری» را جواب درست گرفته بود که سرانجام اصلاحیه خورد!

۱۲ **الف** سه نوکلئوتید دارای ۳ نوکلئوتید است. **ب** یک نوکلئوتید (۰/۱۵) (۳۰°) طبق شکل پاسخ سؤال ۱، فقط یکی از نوکلئوتیدهای جایگاه اتصال، به آمینواسید متصل می‌شود. **پ** خیر (۰/۱۵) (۳۰°) جایگاه اتصال آمینواسید با سایر بخش‌های رنای ناقل پیوند هیدروژنی برقرار نمی‌کند. **ت** بله (۰/۱۵) (۳۰°) زیرا همه رنای ناقل به جز در ناحیه پادرمزه، توالی مشابهی دارند. (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲)

۷ **الف** در همانندسازی برخلاف رونویسی هر دو رشته دنا الگوهستند. (۰/۲۵) (۳۰°) رونویسی برخلاف همانندسازی در هر چرخه یاخته می‌تواند بارها انجام شود. (۰/۲۵) (۳۰°) به سایر تفاوت‌های درست هم نمره تعلق گیرد (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲) و (۰/۲۵) (۳۰°) به جای نوکلئوتید تیمین دار در دنا، نوکلئوتید پوراسیل دار در رنا قرار دارد. (۰/۲۵) (۳۰°)

۸ **الف** (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲) در مرحله آغاز رونویسی، رنای ساخته شده کوتاه است و از ساختار حباب مانند رونویسی خارج نمی‌شود. **ب** ۱ (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲) در مرحله طوبیل شدن، برای اولین بار خروج رنا از ساختار حباب مانند رونویسی دیده می‌شود. **پ** ۲ (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲) در مرحله پایان، رنا به طور کامل از دنا جدا می‌شود.

دقت کنید که تشکیل پیوند هیدروژنی، نیاز به آنزیم ندارد!

۹ **الف** تفاوت (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲) طبق شکل، رنابسپاراز می‌تواند به هر دو رشته دنا متصل شود اما دنابسپاراز فقط به یک رشته متصل می‌شود.




ب شباهت (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲) هر دو آنزیم، طبق شکل فقط از یک رشته دنا می‌توانند به عنوان الگو استفاده کنند. **پ** تفاوت (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲) دنابسپاراز برخلاف رنابسپاراز، توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را ندارد. **ت** شباهت (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲) هر دو آنزیم، توانایی تشکیل پیوند فسفودی‌استر را دارند.

۱۰ **الف** رشته ۱ (۰/۲۵) (۳۰° و ۳۲) **پ** رشته ۲ (۰/۲۵) (۳۰°) رشته رنای ساخته شده توالی مشابه رشته رمزگذار دارد.

پاسخ تشریحی آزمون (۵)

۱ **الف** نادرست (۰/۲۵) (۳۰°) رنای ناقل آغازگر وارد جایگاه **A** ریبوزوم نمی‌شود. **ب** درست (۰/۲۵) (۳۰°) طبق شکل، در ساختار سه بعدی رنای ناقل، حلقه‌های جانبی در مجاورت هم قرار دارند.




پ نادرست (۰/۲۵) (۳۰°) دقت کنید که توالی‌های قبل از کدون آغاز ترجمه نمی‌شوند! **ت** نادرست (۰/۲۵) (۳۰°) قبل از اینکه سومین رنای ناقل در جایگاه **A** ریبوزوم مستقر شود، اولین رنای ناقل باید از جایگاه **E** خارج شود. زیرا امکان ندارد هر سه جایگاه رناتن همزمان توسط رنای‌های ناقل اشغال باشند.

۲ **الف** بزرگ (۰/۲۵) (۳۰°) طبق شکل، ریبوزوم از طرف زیر واحد بزرگ خود به شبکه آندوپلاسمی متصل است.



۲ **(الف)** مهارکننده (۰/۱۵) (من ۳۴) منظور صورت سؤال، توالی اپرатор است که پروتئین مهارکننده به آن متصل می‌شود. **(ب)** راهاهای کوچک (۰/۱۵) (من ۳۶) اتصال برخی راهاهای کوچک به رنای پیک، سبب جلوگیری از کار رناتن و توقف ترجمه می‌شود. **(پ)** رونویسی (۰/۱۵) (من ۳۴) در پروکاریوت‌ها، تنظیم بیان ژن می‌تواند در هر یک از مراحل ساخت رنا با پروتئین تأثیر بگذارد اما به طور معمول در مرحله رونویسی انجام می‌شود. **(ت)** لاکتوز (۰/۱۵) (من ۳۴ و ۳۵) با اتصال لاکتوز به مهارکننده و جدا شدن مهارکننده از اپرатор، به خاطر تغییر شکل مهارکننده رنابسپاراز می‌تواند با عبور از روی اپرатор (توالی مجاور راهانداز)، ژن‌ها را رونویسی کند در حالی که رنابسپاراز هرگز نمی‌تواند از روی جایگاه اتصال فعل کننده در تنظیم مثبت عبور کند.

۳ **(الف)** مشابهی (۰/۱۵) (من ۲۵ و ۳۴) در شکل زیر، ژن‌های اول و دوم فاقد جایگاه پایان رونویسی بر روی خود هستند و جایگاه پایان رونویسی هر سه ژن، روی سومین ژن است. همچنین مشخص است که جهت رونویسی هر سه ژن یکسان است پس رشته‌الگوی مشابهی دارند.



(ب) عوامل رونویسی (۰/۱۵) (من ۲۳ و ۳۵) در پروکاریوت‌ها، انواع مختلفی رنابسپاراز دیده می‌شود. عوامل رونویسی ویژه پروکاریوت‌هاست در حالی که پروتئین فعل کننده در باکتری‌ها دیده می‌شود. **(پ)** قبل (۰/۱۵) (من ۳۶) تغییر در میزان فشرده‌گی فامتن، از روش‌های تنظیم بیان ژن قبل از رونویسی است زیرا بخش‌های فشرده فامتن کمتر در دسترس رنابسپارازها قرار می‌گیرند. **(ت)** یک (۰/۱۵) (من ۳۵) زیرا هر سه ژن تحت کنترل یک راهانداز مشترک هستند و یک توالی تنظیمی دارند در نتیجه از روی هر سه ژن، یک رنای پیک ساخته می‌شود که اطلاعات هر سه ژن را دارد.

۴ **(الف)** پروتئین فعل کننده (۰/۱۵) (من ۳۴ و ۳۵) زیرا عوامل رونویسی همانند فعل کننده‌ها سبب می‌شوند رنابسپاراز بتواند رونویسی را شروع کند. **(ب)** مثبت (۰/۱۵) (من ۳۴ و ۳۵) زیرا در تنظیم مثبت، اتصال قند مالتوز به فعل کننده سبب می‌شود فعل کننده به جایگاه اتصال خود بچسبد و به اتصال رنابسپاراز به راهانداز کمک کند.

۵ **۱ = افزاینده / ۲ = عوامل رونویسی / ۳ = رنابسپاراز**
(الف) آزاد (۰/۱۵) (من ۲۱ و ۳۵) زیرا رنابسپاراز جزو ۴ دسته پروتئین‌های ترشحی، غشایی، آنزیم لیزوزومی و پروتئین واکوئلی نیست، پس توسط ریبوزوم‌های آزاد ساخته می‌شود. (پروتئین‌های نامبرده توسط ریبوزوم‌های متصل به شبکه آندوبلاسمی ساخته می‌شوند) **(ب)** توالی افزاینده (۰/۱۵) (من ۳۵) با ایجاد خمیدگی در دنا (۰/۱۵) (من ۳۵) **(پ)** ۱ (۰/۱۵) (من ۳۵) زیرا توالی افزاینده صرفاً سبب افزایش سرعت و مقدار رونویسی می‌شود و وجود آن برای انجام رونویسی الزامی نیست.

۶ **(الف)** افزایش می‌یابد. **(ب)** افزایش می‌یابد (۰/۱۵) (من ۳۵) با ایجاد خمیدگی در دنا و قرارگیری عوامل رونویسی افزاینده و راهانداز در کنار هم، سرعت و مقدار رونویسی افزایش می‌یابد. **(پ)** افزایش می‌یابد (۰/۱۵) (من ۳۶) کاهش فشرده‌گی فامتن سبب می‌شود ژن‌ها بیشتر در دسترس رنابسپاراز قرار گیرند و میزان رونویسی افزایش می‌یابد.

۷ **(الف)** زیرا همگی از تقسیم میتوانند (رشتمان) (۰/۱۵) (من ۳۴) می‌گیرند. **(ب)** فرایندهایی که تعیین می‌کنند در چه هنگام (۰/۱۵) (من ۳۳) به چه مقدار (۰/۱۵) و کدام ژن‌ها (۰/۱۵) بیان شوند یا نشوند. **(پ)** باعث فعل شدن ژن سازنده آنزیمی می‌شود (۰/۱۵) که در فتوسترن مورد استفاده قرار می‌گیرد. (۰/۱۵) (من ۳۴)


۸ پروتئین‌های ترشحی، غشایی، آنزیم‌های لیزوزومی و پروتئین‌های واکوئلی توسط ریبوزوم‌های شبکه آندوبلاسمی زبر تولید می‌شوند و سایر پروتئین‌های توسط ریبوزوم‌های آزاد تولید می‌شوند.

(الف) آزاد (۰/۱۵) (من ۳۳) زیرا هیکاراز جزو هیچ کدام از چهار گروه پروتئین‌های گفته شده نیست. **(ب)** آزاد (۰/۱۵) (من ۳۴) زیرا عامل آزادکننده جزو هیچ کدام از چهار گروه پروتئین‌های گفته شده نیست. **(پ)** متصل به شبکه آندوبلاسمی زبر (۰/۱۵) (من ۱۸ و ۱۹ و ۳۱) زیرا پمپ سدیم - پتانسیم نوعی پروتئین غشایی است. **(ت)** آزاد (۰/۱۵) (من ۲۹ و ۳۱) زیرا پروتئین ساختار رناتن جزو هیچ کدام از چهار گروه پروتئین‌های گفته شده نیست.

۹ **(الف)** ۳ (۰/۱۵) (من ۳۴) در مرحله آغاز، زیرا واحد کوچک رناتن کدون آغاز را شناسایی می‌کند و به رنای پیک متصل می‌شود. **(ب)** ۲ (۰/۱۵) (من ۳۴) تنها مرحله‌ای از ترجمه که در آن حرکت ریبوزوم دیده می‌شود، طویل شدن است. **(پ)** ۴ (۰/۱۵) (من ۳۴) در مرحله پایان ترجمه، خروج آخرین رنای ناقل از جایگاه P صورت می‌گیرد نه E.

دقت کید که در هیچ کدام از مراحل ترجمه، شکستن پیوند پتیدی دیده نمی‌شود.


۱۰ شکل صورت سؤال، مربوط به ریبوزوم کامل است. **(الف)** رنابسپاراز RNA پلی‌مراز (۰/۱۵) (من ۲۷ و ۳۹) ریبوزوم شامل پروتئین و tRNA است. از روی ژن‌های پروتئین‌ساز یاخته جانوری، رنابسپاراز ۲ رونویسی می‌شود. **(ب)** tRNA (پلی‌مراز) ۱ (پلی‌مراز) (۰/۱۵) (من ۲۷ و ۳۹) ریبوزوم سایر ژن‌ها را شناسایی می‌کند. زیرا باید از روی ژن‌های پروتئین‌ساز (یارنای رناتنی) mRNA (یارنای پیک) تولید شود و همچنین رنابسپاراز ۱ هم وظیفه تولید tRNA (یارنای رناتنی) را بر عهده دارد. **(پ)** بزرگ (۰/۱۵) (من ۲۹ و ۳۰) طبق شکل، رشته پلی‌پتیدی از زیرا واحد بزرگ رناتن بیرون می‌زند.



۱۱ **(الف)** زیرا برای رمزهای پایان (۰/۱۵) (من ۳۴) ناقل وجود ندارد (۰/۱۵) (من ۲۹) **(ب)** دانه‌های تسبیح = ریبوزوم‌ها (رناتن‌ها) (۰/۱۵) و نخ تسبیح = رنای mRNA (۰/۱۵) (من ۳۴) **(پ)** هر چه طول عمر رنای پیک بیشتر باشد (۰/۱۵) میزان پروتئین‌سازی آن‌ها بیشتر است (۰/۱۵) (به «رابطه مستقیم دارند») هم نمره تعلق می‌گیرد (من ۳۴)

پاسخ تشریحی آزمون (۶)

۱ **(الف)** نادرست (۰/۱۵) (من ۳۴) حتی در حالت اتصال مهارکننده به اپرатор هم شناسایی راهانداز توسط رنابسپاراز می‌تواند روی دهد و مرحله آغاز رونویسی شروع شود. **(ب)** نادرست (۰/۱۵) (من ۳۵) طبق شکل، هرگز عامل رونویسی متصل به راهانداز، در تماس با توالی افزاینده قرار نمی‌گیرند.




(پ) درست (۰/۱۵) (من ۳۴ و ۳۶) هم در پروکاریوت‌ها و هم در پروکاریوت‌ها تنظیم بیان ژن‌ها می‌تواند با تغییر در طول عمر (پایداری) رنای پیک صورت گیرد. **(ت)** نادرست (۰/۱۵) (من ۳۴ و ۳۵) توالی‌های اپرатор، جایگاه اتصال فعل کننده و توالی افزاینده، هیچ کدام جزو ژن نیستند و رونویسی نمی‌شوند.

ت) درست (۱۵) (من ۳۳ و ۳۴) در صورت وجود گلوكز در محیط، دیگر بود و نبود لاکتوز مهم نیست وزن های تجزیه لاکتوز بیان نمی شوند. **ث**) نادرست (۱۵) (من ۳۱) به ویژگی های ارثی جاندار در علم زیست شناسی، صفت گفته می شود. **ج**) نادرست (۱۵) (من ۳۹) دقت کنید که ال، در ساختار DNA است نه در غشای سلول! **ج**) درست (۱۵) (من ۵۱ و ۵۵) انتخاب طبیعی، علت مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست ها را توضیح می دهد. انتخاب طبیعی با حذف افراد ناسازگار، از گوناگونی در جمعیت می کاهد و سبب کاهش توان بقای جمعیت می شود. **ح**) نادرست (۱۵) (من ۵۰) به عنوان مثال در جهش واژگونی، تعداد ژن ها می تواند ثابت بماند. در این جهش طول کروموزوم ثابت است پس اگر این جهش سبب تغییر محل سانترومر نشود، در کاریوتیپ قابل تشخیص نخواهد بود.

۲ الف سلولاز (NH_3O^+) (ص ۱۴۵) آنزیم سلولاز که در تجزیه سلولز به گلوكز نقش دارد، در کاغذسازی و تولید سوخت زیستی استفاده می‌شود.


ب فعالسازی (H_2O) (ص ۱۸) آنزیم‌ها (کاتالیزورهای زیستی) امکان برخورد مناسب مولکول‌ها را افزایش و انرژی فعالسازی واکنش را کاهش می‌دهند.

پ آمین یا (NH_3O^+) (ص ۱۷ و ۱۵۰) همواره رشته پیتیدی از سمت سر آمین به سمت سر کربوکسیل تشکیل می‌شود. **ت** هسته (H_2O) (ص ۲۵ و ۳۶) فرایند پیرایش در هسته انجام می‌شود پس در هسته، امکان مشاهده همزمان رنهاهای پیک بالغ و نایاب وجود دارد. **ث** سه (H_2O) (ص ۱۴۵) ذرت‌هایی که فقط دو جایگاه ثانی ناخالص دارند، مثلاً می‌توانند به صورت AaBbCC یا AaBbcc یا ... باشند پس دارای ۲ یا ۴ الی بارز هستند و از ذرت‌هایی با سه الی بارز، فاصله یکسانی دارند.




ج) مغز (۱۴۵) و (۱۴۶) در بیماری فنیل کتونوری، تجمع فنیل الانین در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناکی منجر می‌شود که سبب آسیب مغز می‌شوند.
 ج) حذف (۱۴۵) و (۱۴۶) جهش حذفی، طول کروموزوم را تغییر می‌دهد اما تأثیری بر فامتن همتا یا غیرهمتا آن کروموزوم ندارد. ح) پرتو فرابینفشن با UV (۱۴۵) و (۱۴۶) شکل مربوط به دوپار تیمین است که در اثر پرتو UV ایجاد می‌شوند.

۳-الف) آمین (۱۷) و پیوندهای هیدروژنی در ساختار دوم پرتوئین، بین گروههای آمین و کربوکسیل برقرار می‌شود و در ساختار سوم، بین گروههای R برقرار می‌شود. **ب)** ویتمین (۱۸) کوانزیم یک ماده آلی است پس بونهای آهن و مس کوانزیم نیستند. **پ)** رنای پیک (۱۹) در فرایند ترجمه، اطلاعات رنای پیک به پلی پپتید ترجمه می‌شود. **ت)** برخلاف (۲۰) در تنظیم منفی رونویسی برخلاف تنظیم مثبت، اپرаторین راهانداز و ژن‌ها قبار دارد و راهانداز در محاورت ژن‌ها نیست.



۳) شایع ترین (۱۴۳ ص/۱۵۰) شایع ترین (نه تنها نوع!) بیماری هموفیلی، ممبوط به فقدان فاکتور انعقادی، شماره VIII است.



ب) AA_nB_mC_p و AaB_nC_m (نوع ۱۵) (نوع ۱۶) زیرا هر دو تعداد برابری الی بارز (عدد ۴) دارند.

۱۶ چون همه فرزندان پسر هموفیل می‌شوند، پس مادر $X^h X^h$ است زیرا در این حالت هر X^h خود را به پسرش بدهد پسر قطعاً بیمار می‌شود. (ص ۴۳)

	X^H	Y
X^h	$(\circ/\mathbb{P}\Delta) X^H X^h$	$(\circ/\mathbb{P}\Delta) X^h Y$
X^h	$(\circ/\mathbb{P}\Delta) X^H X^h$	$(\circ/\mathbb{P}\Delta) X^h Y$

۱۷ **الف)** ماموتهای (۲۵٪) منجمد شده (۴٪) (یا حشرات (۲۵٪) به دام افتداده در رزین گیاهان (۲۵٪) (من (۲۵٪) ب) برگ (من (۲۵٪) سنگواره برگ گیسونشان می‌دهد این درخت ۱۷۰ میلیون سال پیش هم وجود داشته است.

۱۸ زیرا تأثیر فوری (۲۵٪) بر رخنمود ندارند (۲۵٪) (ص ۵۱) اما با تغییر شرایط محیط، ممکن است دگرهای جدید سارگارتر از دگرهای قدیمی عمل کند.

۱۹ **الف)** رانش دگرهای (۱۴۵) (ص ۵۵) **ب)** کاهش (۱۴۵) (ص ۵۷ و ۵۸ و ۵۹) هر عاملی که سبب کاهش گوناگونی در جمعیت شود، سبب کاهش توان بقای جمعیت می‌شود. **پ)** به سازش نمی‌انجامد (ارتباطی با سازگاری با محیط ندارد). **ت)** معکوس (۱۴۵) (ص ۵۵) رانش در جمعیت‌های

الف) واژگونی (۱۴۵) و جابه‌جایی (۱۴۵) (ص ۵۰ و ۵۱) دقیق کنید که در جهش جابه‌جایی که قطعه‌ای از فامتن به بخش دیگر همان فامتن متصل می‌شود، طول کروموزوم ثابت می‌ماند. در واژگونی نیز قسمت جدا شده از فامتن به صورت معکوس به جای خود باز می‌گردد. **ب)** سنگواره‌ها، تشریح مقایسه‌ای و مطالعات مولکولی (ذکر دو مورد) (ص ۵۷ و ۵۸) **پ)** شارش ژن (۱۴۵) زیرا سده‌های حفاظتی، مانع از انجام شارش ژن می‌شوند.

پیاسخ تشریحی آزمون (۱۴)


الف) درست(۱۴۵) (ص۳) طبق شکل کتاب درسی، قطر باکتری استریتوکوکوس نوموبنیای پوشینه دار، حدود ۸۰۰ نانومتر است. **ب)** نادرست! **پ)** دقت کنید که گریفیت، متوجه نشد ماده و راثی، دناست! **پ)** نادرست(۱۴۶) (ص۲۵) هرگاه رشته مورد رونویسی دو ژن متفاوت باشد، جهت رونویسی آنها نیز متفاوت است پس رنابسپارازهای آن دو ژن می‌توانند به یکدیگر نزدیک با از هم دور شوند.



پ) بکسان (۲۵٪) (می ۲۴ و ۲۵٪) زیرا جهت رونویسی هر دو بکسان است (۲۵٪) و هر دو از چپ به راست در حال رونویسی هستند پس رشته موردنویسی آنها بکسان است. **ت)** یک نوع (۲۵٪) (می ۲۶٪) تمامی رنابسپارازهایی که همزمان در حال رونویسی از یک ژن هستند، از یک نوع هستند. **ث)** خیر (۲۵٪) زیرا از ساختار حباب مانند رونویسی خارج شده و قابل مشاهده اند. **ع)** (می ۲۳٪) در مرحله آغاز رونویسی، خروج رنا از حباب رونویسی مشاهده نمی شود.

۱۰ الف) بخش هایی از رنای پیک (۲۵٪) (می ۳٪) در مرحله آغاز ترجمه، ابتدا بخش هایی از رنای پیک، زیرا واحد کوچک رنات را به سوی رمزه آغاز هدایت می کنند. **ب)** متیونین (۲۵٪) (می ۳٪) رنای ناقل آغازگر، مکمل کدون AUG است و حامل متیونین است.

۱۱ الف) خیر (۲۵٪) (می ۳٪) طبق شکل زیر، در مرکزی ترین بخش رنای ناقل، پیوند هیدروژنی نداریم.



پ) A و E (می ۳٪) در مرحله پایان ترجمه، رنای ناقل فقط در جایگاه P مشاهده می شود.

۱۲ ژنتیپ مرد به صورت dd AB است.

الف) O (می ۲۵٪) (می ۳٪ و ۱٪) چون مرد AB است و فرزند هم AB شده است، پس زن باید ال A یا B یا هر دو را داشته باشد که فرزند بتواند AB شود در نتیجه زن قطعاً گروه خونی O را ندارد. **ب)** خیر (۲۵٪) (می ۳٪ و ۱٪) چون مرد AB است، قطعاً یک ال A یا B به فرزند می دهد و فرزند هرگز O نمی شود. **پ)** DD یا Dd (می ۳٪ و ۳٪) (می ۳٪ و ۳٪) چون مرد dd است و فرزند مثبت شده است، قطعاً فرزند Dd است و یک D از مادرش گرفته است. در نتیجه مادر باید D داشته باشد و می تواند DD یا Dd باشد.

۱۳ صفات فرزندان آمیخته ای از صفات والدین (۲۵٪) (می ۳٪) آنهاست. (می ۲٪)

۱۴ الف) X^HY و X^hY (می ۳٪) (می ۳٪) ب) قرمز (۲۵٪) (می ۳٪ و ۳٪) زیرا ال های بارز بیشتری نسبت به ال های نهفته دارد.


۱۵ الف) کروموزوم شماره ۱ (می ۲۵٪) (می ۳٪) جایگاه ژنهای Rh روی کروموزوم شماره ۱ است. **ب)** گستته (۲۵٪) زیرا فقط دو حالت مثبت و منفی را دارد. (می ۲٪) (می ۳٪)

۱۶ زون گویچه های قرمز پدر و مادر فقط در مقدار کم اکسیژن داسی شکل می شود، پس هر دو ناخالص و Hb^AHb^S هستند.

الف) بله (۲۵٪) (می ۳٪ و ۵٪) کافی است یکی از والدین ال Hb^A و دیگری ال Hb^S را به فرزند خود بدهنند تا فرزند Hb^AHb^S شود و به مalaria مقاوم باشد. **ب)** بله (۲۵٪) (می ۳٪ و ۵٪) اگر هر یک از والدین یک ال Hb^A به فرزند بدهنند، فرزند Hb^AHb^A خواهد شد و در معرض ابتلا به malaria قرار خواهد داشت.

۱۷ الف) ب) معنا (۲۵٪) زیرا رمز آمینواسید به رمز پایان تبدیل شده است. **پ)** خیر (۲۵٪) (می ۳٪ و ۵٪) دقت کنید که تغییر چارچوب از پیامدهای جهش اضافه و حذف است.

ج) قطعاً (۲۵٪) (می ۳٪) اگر A: ال سالم باشد، پسر بیمار در بیماری وابسته به X باز به صورت XY است. چون X پسر همیشه از مادرش می آید، پس مادر قطعاً یک X دارد و چون بیماری باز به تبادل قطعات بین کروموزوم های همتا دارد پس در یاخته تک لاد نمی تواند روی دهد چون در یاخته نکلا، کروموزوم همتا نداریم. **ح)** چهار (۲۵٪) (می ۵٪) طبق شکل، در صورت وقوع کراسینگ اوور، در هر تقسیم میوز حداقل چهار نوع گامت تولید می شود.



۴ الف) مرحله دوم (۲۵٪) (می ۳٪) در مرحله دوم آزمایش ایوری، با استفاده از گریزانه با سرعت بالا، مواد عصاره باکتری کشته شده به صورت لایه لایه جدا شد. **ب)** ایوری (۲۵٪) (می ۳٪) ایوری متوجه شد که ماده و راثتی، همان مولکول DNA است. **پ)** پروتئین (۲۵٪) (می ۳٪) بسیاری از دانشمندان زمان ایوری، پروتئین ها را ماده و راثتی می دانستند.

۵ الف) موش (۲۵٪) (می ۳٪) زیرا موش یوکاریوت است و در یوکاریوت ها چندین نقطه آغاز همانندسازی در هر دناریم. **ب)** هسته (۲۵٪) (می ۳٪) هیستون ها، در هسته یاخته یوکاریوت به DNA متصل اند و همان جاذب DNA جدامی شوند.

۶ شکل مربوط به پروتئین میوگلوبین است و $\frac{1}{2} = \frac{2}{Fe^{2+}} = \frac{3}{Zn^{2+}}$ زنجیره پیتیدی

الف) بخش ۱: Fe^{2+} و بخش ۲: هم (۲۵٪) (می ۷٪) ب) سوم (۲۵٪) (می ۷٪) زیرا فقط شامل یک رشته پیتیدی است. **ب)** پرتو ایکس (۲۵٪) (می ۷٪) دانشمندان با استفاده از تصاویر حاصل از پرتو ایکس و روش های دیگر، ساختار سه بعدی پروتئین ها و جایگاه هر اتم را می توانند مشخص کنند.

۷ الف) ۲ (۲۵٪) (می ۷٪) واتسون و کریک، مشخص کردند که دنا دو رشته دارد. **ب)** ۱ (۲۵٪) (می ۷٪) ویلکینز و فرانکلین صرفاً گفتند دنا بیش از یک رشته است اما در رشته ای بودن آن را نفهمیدند. **پ)** ۴ (۲۵٪) (می ۷٪) مزلسون و استال، دناهای حاصل از همانندسازی را در شبیه ای از محلول سزیم کلرید قرار دادند. **ت)** ۵ (۲۵٪) (می ۷٪) چارگا ف صرفاً متوجه شد مقدار A با T برابر است اما دلیل این برابری را واتسون و کریک فهمیدند.

دقت کنید که چگونگی انتقال دنا بین دو یاخته را هیچ کدام از دانشمندان کتاب درسی، متوجه نشند.

۸ ژن و پروتئین (۲۵٪) (می ۳٪) بیماری کم خونی داسی شکل، به نوعی ارتباط بین ژن و پروتئین را نشان می دهد.

۹ شکل صورت سؤال، نشان دهنده رونویسی همزمان چندین رنابسپاراز از ژن های بسیار فعال است.

الف) ژن سازنده رنای رناتنی (۲۵٪) (می ۲٪) زیرا ژن های سازنده رنای رناتنی در یاخته تازه تقسیم شده بسیار فعال اند. **ب)** یک (۲۵٪) (می ۲٪) علامت سؤال، نشان دهنده توالی بین ژنی است که در آن یک راه انداز مربوط به ژن سمت راست دیده می شود.