

۲۰ دقیقه


فصل ۵

ریاضی ۱ و ۲ | سهمی، تابع درجه دو

زیرن

۱۷

ایستگاه ۲



۱. قرار است در کنار یک رودخانه، زمینی مستطیل شکل را نرده کشی کنیم (مطابق شکل). اگر فقط هزینهی نصب ۷۲ متر نرده را داشته باشیم، بیشترین مساحت ممکن برای این زمین چقدر خواهد بود؟

- ۱) ۳۲۴ (۲) ۶۴۸ (۳) ۵۲۴ (۴) ۱۰۴۸


۲. نمودار سهمی $y = ax^2 + bx + c$ محور y ها را در نقطه‌ای به عرض k و محور x ها را در نقاطی به طول $1-k$ و k قطع کرده و بیشترین مقدار سهمی $\frac{9}{4}$ است. k کدام می‌تواند باشد؟

- ۱) $\frac{4}{5}$ (۲) $\frac{2}{5}$ (۳) $\frac{5}{2}$ (۴) $\frac{5}{4}$

۳. رأس سهمی $y = (3m+4)x^2 - 3(m-1)x + 9$ در ناحیه‌ی دوم قرار دارد. بیشترین طول بازه‌ی قابل قبول برای m کدام است؟


- ۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۴. شکل مقابل، نمودار تابع $f(x) = ax^2 + bx + c$ است. اگر بیشترین مقدار تابع $-2a - 9$ باشد، $f(\frac{b}{a})$ کدام است؟



- ۱) -۲۷ (۲) ۹ (۳) -۹ (۴) ۲۷

۵. نقطه‌ی ماکزیمم تابع $y = -2x^2 + mx - m - 1$ روی خط مقابل است. مجموع مقادیر ممکن برای m کدام است؟



- ۱) ۳ (۲) ۸ (۳) ۲ (۴) ۴

۶. سهمی $y = x^2 - 2mx - m + 2$ حداکثر یک صفر دارد که آن هم مثبت است. کمترین مقدار صحیح m کدام است؟

- ۱) -۲ (۲) -۱ (۳) صفر (۴) -۳


۷. کمترین فاصله‌ی مبدأ مختصات از نقاط روی منحنی $y = \sqrt{x^2 - 4x + 7}$ چقدر است؟

- ۱) $\sqrt{5}$ (۲) $\sqrt{13}$ (۳) ۵ (۴) ۱۳

۸. اگر تابع $y = (1-m)x^2 + (m^2 - 6)x + 1$ در نقطه‌ای به طول -۱ ماکزیمم داشته باشد، کمترین مقدار $y = mx^2 + 2mx$ کدام است؟


- ۱) $-\frac{1}{4}$ (۲) -۳ (۳) -۲ (۴) $-\frac{3}{4}$

۹. نمودار تابع $y = (m+4)x^2 - 4x + m + 1$ به صورت مقابل است. چند مقدار صحیح برای m وجود دارد؟



- ۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۱۰. نمودار سهمی $y = ax^2 - (6a-1)x + b$ به صورت مقابل است. مساحت ناحیه‌ی رنگی چقدر است؟



- ۱) $\frac{1331}{16}$ (۲) $\frac{1331}{32}$ (۳) $\frac{1573}{32}$ (۴) $\frac{1573}{16}$

۲۰ دقیقه

فصل ۱

ایستگاه ۳

۱. دو ضلع روبه‌روی یک مربع به معادلات $ax + 2y = 6$ و $3x + y + b = 0$ بوده و مساحت مربع $b + 3$ است. فاصله‌ی $A(a, b)$ تا نیمساز ربع اول و سوم کدام است؟

- (۱) $\sqrt{2}$ (۲) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳) $2\sqrt{2}$ (۴) $\frac{1}{2}$


۲. مساحت مثلث ABC با رئوس $A(m, 2)$ ، $B(m-3, 4m)$ و $C(-1, m+2)$ برابر $\frac{1}{2}$ است. کدام عدد نمی‌تواند باشد؟

- (۱) 1 (۲) $\frac{-3}{4}$ (۳) $\frac{\sqrt{17}-1}{8}$ (۴) $\frac{1+\sqrt{17}}{8}$

۳. دو نقطه بر روی خط $x + y = 1$ وجود دارد که فاصله‌ی این نقاط از خط $D: 3x + 4y - 1 = 0$ برابر ۲ است. مجموع طول این دو نقطه کدام است؟

- (۱) 6 (۲) -6 (۳) 7 (۴) -7

۴. در شکل مقابل اگر M و H به ترتیب پای میانه‌ی AM و ارتفاع AH باشد. طول MH کدام است؟



- (۱) $\sqrt{42}$ (۲) $\sqrt{68}$ (۳) $\sqrt{58}$ (۴) $\sqrt{32}$

۵. ضلع یک مثلث به مساحت ۶ بر خط به معادله‌ی $2y + x = 3$ واقع و یک رأس آن نقطه‌ی $(-1, 0)$ است. اگر ضلع دیگر این مثلث بر محور x ها منطبق باشد. طول میانه‌ی وارد بر این ضلع کدام است؟

- (۱) $4\sqrt{2}$ (۲) 6 (۳) $3\sqrt{3}$ (۴) 5

۶. نقطه‌ی $A(-4, -2)$ روی خط به معادله‌ی $3x + by + c = 0$ قرار دارد. اگر فاصله‌ی قرینه‌ی A نسبت به محور x ها تا خط ℓ $3/2$ باشد. $b - c$ کدام می‌تواند باشد؟

- (۱) -4 (۲) -8 (۳) -10 (۴) -12

۷. خط $x - 2y + m = 0$ در نقطه‌ی T به دایره‌ای به مرکز $P(-1, 1)$ مماس است. اگر فاصله‌ی T تا P برابر $\sqrt{5}$ باشد. فاصله‌ی مبدأ تا این خط کدام عدد زیر می‌تواند باشد؟

- (۱) $\sqrt{5}$ (۲) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ (۳) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (۴) $2\sqrt{5}$

۸. در مثلث متساوی‌الساقین ABC ($AB = AC$)، قاعده‌ی BC بر روی خط $y = 2x - 3$ قرار دارد. اگر $A(4, -1)$ و طول نقطه‌ی B برابر ۵ باشد. آن‌گاه مختصات نقطه‌ی C کدام است؟

- (۱) $(-\frac{9}{5}, -\frac{33}{5})$ (۲) $(\frac{9}{5}, -\frac{33}{5})$ (۳) $(-\frac{9}{5}, \frac{33}{5})$ (۴) $(\frac{9}{5}, \frac{33}{5})$

۹. فاصله‌ی نقطه‌ی $(-3, 5)$ از خط $4x + ky = 6k$ برابر ۳ است. حاصل جمع مقادیر ممکن برای k کدام است؟

- (۱) 1 (۲) 2 (۳) 3 (۴) 4

۱۰. دو ضلع مقابل یک مربع. بر دو خط $x + 2y = 2a + 1$ و $ax - 6y = 9$ منطبق هستند. فاصله‌ی محل تلاقی قطرهای این مربع از هر رأس آن چقدر است؟

- (۱) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ (۲) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (۳) $\frac{\sqrt{10}}{5}$ (۴) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

شبیه‌ساز کنکور

۲۰ دقیقه

جمع‌بندی معادله و نامعادله

آزمون

۲۱

ریاضی ۱	ریاضی ۲	ریاضی ۳
فصل ۴	فصل ۱	-

۱. معادله‌ی $3x - \frac{m+1}{2x+1} = 2$ دو جواب حقیقی (α و β) دارد که بین آن‌ها رابطه‌ی $6\alpha = 2\beta + 5$ برقرار است. در این صورت،

معادله‌ی $\frac{mx}{x-1} + \frac{x-1}{x} = m$ چند جواب دارد؟

- (۱) هیچ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۲. حاصل ضرب جواب‌های معادله‌ی $\frac{4}{x^2-2x-3} - \frac{2}{x^2-4x+3} = a$ برابر ۲- است. جواب معادله‌ی $|2x+a| = |ax-1|$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $-\frac{1}{4}$ (۳) $\frac{1}{3}$ (۴) $-\frac{1}{3}$

۳. اعداد $x = -1$ و $x = b$ جواب‌های معادله‌ی $\frac{a}{2x-1} - \frac{1}{x} = 4$ هستند. در این صورت، ریشه‌ی دوم $2b$ کدام است؟

- (۱) $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $\pm \frac{1}{2}$ (۳) ± 1 (۴) $\pm \frac{1}{4}$

۴. اگر سه شیر A، B و C هم‌زمان باز باشند، ۳ ساعته استخری را پر می‌کنند. اگر دو شیر A و B را باز کنیم، ۴ ساعته استخر پر می‌شود. شیر C به تنهایی در چند ساعت استخر را پر می‌کند؟

- (۱) ۶ (۲) ۸ (۳) ۱۰ (۴) ۱۲

۵. تمام جواب‌های مشترک نامعادله‌های $\frac{3x+6}{2} - \frac{3-x}{3} > \frac{1}{2}$ و $\frac{4x-2}{3} > 2x-3$ به فرم (α, β) است. $2\beta + 11\alpha$ کدام است؟

- (۱) -۴ (۲) -۱ (۳) -۲ (۴) -۳

۶. اگر جدول تعیین علامت عبارت $P = ((n-2)x + m + 1)(x + 2b)^2$ به صورت زیر باشد، مقدار عددی $mn + b$ کدام است؟ ($n \in \mathbb{N}$)

x	$-\infty$	-۲	۳	$+\infty$
P	+	+	+	-

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

- (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) ۳ (۴) ۴

۷. چند عدد طبیعی m در نامساوی $\frac{2x^2-x+m}{x^2+x+1} > 1$ صدق نمی‌کند؟


- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۸. یک موشک کاغذی فاصله‌ی ۵ متری را در جهت موافق باد رفته و در خلاف جهت برگشته است. سرعت باد ۵ متر بر دقیقه و مدت زمان رفت و برگشت ۳۲ ثانیه است. سرعت موشک در هوای بدون باد چند متر بر دقیقه است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۱۵ (۴) ۲۵

۹. سهمی مقابل، نمودار $y = f(x)$ است. اگر اشتراک جواب‌های نامعادله‌های $\frac{f(x)}{x} \leq 0$ و $2x + 7 > 0$ را به فرم $(a, b] \cup [c, d)$ بنویسیم، مقدار $2a - b - c - d$ کدام است؟

- (۱) -۲ (۲) -۳ (۳) -۴ (۴) -۵



۱۰. معادله‌ی $3x - 2 + \sqrt{4x-3} = 0$ از نظر تعداد جواب‌ها چگونه است؟

- (۱) یک جواب دارد. (۲) دو جواب هم‌علامت دارد. (۳) دو جواب با علامت مخالف دارد. (۴) جواب ندارد.

ریاضی ۱	ریاضی ۲	ریاضی ۳
فصل ۵	فصل ۳	فصل ۱

۲۰ دقیقه

۱. اگر $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ و $g(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ باشد. حاصل $f(1400 + \frac{1}{1400}) + g(1400 - \frac{1}{1400})$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{1}{700}$ (۲) ۲۸۰۰ (۳) $\frac{1}{700}$ (۴) ۱۴۰۰

۲. نمودار وارون تابع $f(x) = -(x+2)^2 - 2$ ، نمودار $g(x) = 1 - (3-x)^2$ را در چند نقطه قطع می‌کند؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) هیچ


۳. اگر برد تابع $g(x) = 2f(x-1) - 1$ به صورت $(1, 2)$ باشد. برد تابع $h(x) = 1 - 3f(2-x)$ کدام است؟

- (۱) $(-\frac{7}{2}, -2)$ (۲) $(-3, -2)$ (۳) $(-\frac{7}{2}, -\frac{3}{2})$ (۴) $(-3, -\frac{3}{2})$

۴. f روی \mathbb{R} اکیداً نزولی است و $g(x) = \sqrt{f(x^2 + 2x) - f(-2x + 12)}$ و $h(x) = \sqrt{f(|3x + 6|) - f(|x - 1|)}$ در این صورت دامنه $(g+h)(x)$ کدام است؟

- (۱) $[-3, -\frac{5}{4}]$ (۲) $[-\frac{7}{2}, -1]$ (۳) $[-\frac{7}{2}, -2]$ (۴) $[-\frac{7}{2}, -\frac{5}{4}]$

۵. اگر نمودار دو تابع f و g به صورت زیر باشد. آن‌گاه دامنه $f \circ g$ شامل چند عدد صحیح است؟




- (۱) ۴
(۲) ۵
(۳) ۶
(۴) ۸

۶. اگر f تابعی اکیداً نزولی با دامنه \mathbb{R} باشد. دامنه $y = \sqrt{f(|x-2|) - f(|2x-1|)}$ کدام است؟

- (۱) $[1, +\infty)$ (۲) $[-1, 1]$ (۳) \mathbb{R} (۴) $\mathbb{R} - (-1, 1)$

۷. شکل مقابل نمایش $y = f(x)$ است. هرگاه $g(x) = \frac{-1}{2}x + 3$ باشد. در این صورت نمودار تابع $h(x) = 1 - 3(f \circ g^{-1})(x)$ از کدام ربع (ها) نمی‌گذرد؟



- (۱) دوم
(۲) اول
(۳) دوم و سوم
(۴) اول و چهارم

۸. هرگاه $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ و $g \circ f = f \circ g$ در این صورت ریشه $g(x) = 1$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) $-\frac{1}{2}$ (۳) -۱ (۴) $\frac{1}{2}$

۹. توابع $f(x) = 5 - \sqrt{2x-6}$ و $g(x) = (f \circ f^{-1})(x) + (f^{-1} \circ f)(x)$ مفروض‌اند. نمودار تابع $g(x)$ در بازه $[a, b]$ به شکل یک پاره‌خط است. بیشترین مقدار طول این پاره‌خط کدام است؟

- (۱) $2\sqrt{3}$ (۲) $2\sqrt{5}$ (۳) $3\sqrt{2}$ (۴) $3\sqrt{3}$

۱۰. اگر f تابعی پیوسته و اکیداً نزولی روی \mathbb{R} ، g تابعی پیوسته و اکیداً صعودی روی \mathbb{R} و $f(1) = g(-1) = 0$ باشد. دامنه $y = \sqrt{\frac{(x+2)g(x)}{(x-2)f(x)}}$ تعریف تابع کدام است؟


- (۱) $[-2, 2] - (-1, 1)$ (۲) $[-2, 2) - (-1, 1)$ (۳) $(-2, 2) - (-1, 1)$ (۴) $[-2, 2) - [-1, 1)$

ریاضی ۲ و ۳ | توابع مثلثاتی

فصل ۱۰

۲۰ دقیقه

ایستگاه ۷




۴ (۴)

۱. شکل مقابل مربوط به $f(x) = c + a \sin bx$ است. $ab + c$ کدام است؟

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)




۲. شکل روبه‌رو قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a - 3 \cos(\frac{3\pi}{2} - bx)$ است. $f(\frac{19\pi}{4})$ کدام است؟

$\frac{3 + 3\sqrt{2}}{2}$ (۲)

$\frac{3 - 3\sqrt{2}}{2}$ (۱)

$\frac{2 - 2\sqrt{3}}{2}$ (۴)

$\frac{2 - 3\sqrt{2}}{2}$ (۳)




1/4 (۴)

1/3 (۳)

۱ (۲)

۰ (۱)

۴. شکل مقابل قسمتی از نمودار تابع $y = 1 + a \tan \pi(1 + bx)$ است. حاصل ab کدام است؟



$4\sqrt{3}$ (۴)

$-\frac{8\sqrt{3}}{3}$ (۳)

$-4\sqrt{3}$ (۲)

$\frac{8\sqrt{3}}{3}$ (۱)

۵. تابع $f(x) = \tan(\frac{\pi}{4}x)$ در بازه‌ی (a, b) صعودی است. حداکثر مقدار $b - a$ کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)


۶. خط $y = 4$ نمودار تابع $y = 1 + \sqrt{3} \tan 3x$ را در بازه‌ی $(0, a)$ در نقطه قطع می‌کند. حداکثر مقدار a کدام است؟

$\frac{19\pi}{18}$ (۴)

$\frac{7\pi}{6}$ (۳)

$\frac{10\pi}{9}$ (۲)

$\frac{4\pi}{3}$ (۱)




۷. شکل مقابل قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a \cos(bx + \frac{1}{4}\pi) + c$ است. حاصل abc کدام است؟

-۱۲ (۲)

۱۲ (۱)

-۲۴ (۴)

۲۴ (۳)



√3 (۴)

-√3 (۳)

$\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۲)

$-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۱)


۹. در کدام تابع زیر، ماکزیمم تابع از مینیمم آن ۵ واحد بیشتر و دوره‌ی تناوب آن 1/3 است؟

$y = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \cos(6\pi x)$ (۴)

$y = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cos(6x)$ (۳)

$y = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} \sin(6\pi x)$ (۲)

$y = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \cos(6\pi x)$ (۱)



۱۰. شکل مقابل قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a + b \sin(\frac{\pi}{4} + x)$ را نمایش می‌دهد. مقدار $f(\frac{17\pi}{4})$ کدام است؟

1/2 (۲)

صفر (۱)

۲ (۴)

-1/2 (۳)

ریاضی ۳ | مشتق تابع مرکب



۲۰ دقیقه

فصل ۱۲

ایستگاه ۶

۱. اگر $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x$ باشد. خط مماس بر نمودار تابع $g \circ f(x)$ در چند نقطه موازی محور طول‌هاست؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) صفر

۲. اگر مشتق تابع $f(\sqrt{|x|+6})$ در $x = -2$ برابر $\frac{1}{3}$ باشد. آنگاه مشتق تابع $f(\frac{2x}{3x-1})$ در $x = \frac{1}{2}$ کدام است؟


- ۳۲ (۱) ۱۶ (۲) -۳۲ (۳) -۱۶ (۴)

۳. هرگاه $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5} = 3$ و برای هر x متعلق به دامنه‌ی توابع f و g . داشته باشیم $f(3-2x) + g(x^2+x) = 2x-1$. آنگاه حاصل $g'(0)$ کدام است؟

- ۸ (۱) -۴ (۲) صفر (۳) -۶ (۴)

۴. هرگاه $2 = g'(2) = f'(2) = 4f(2) = (f \circ g)'(2) = \frac{5}{2}$ باشد. آنگاه مشتق تابع $y = g^3(3x^2-1)$ در $x = 1$ کدام است؟

- $\frac{169}{18}$ (۱) $\frac{169}{6}$ (۲) $\frac{169}{12}$ (۳) $\frac{169}{8}$ (۴)



۵. شکل مقابل نمودار توابع f و g را نمایش می‌دهد. حاصل $(f \circ g)'(5)$ کدام است؟

- $-\frac{16}{9}$ (۱) $-\frac{32}{9}$ (۲) $\frac{16}{9}$ (۳) $\frac{32}{9}$ (۴)

۶. هرگاه $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f^2(x) - 1}{x^2 - 9} = 4$ و $f(\sqrt{2x+5}) = g(x^2+x)$ باشد. حاصل $10 \cdot g'(6)$ کدام است؟

- ± 4 (۱) ± 8 (۲) ± 12 (۳) ± 16 (۴)

۷. اگر $f(x) = \frac{x^2-2}{1+x^3}$ و $g(x) = \sqrt[3]{x-1}$. آنگاه حاصل $f'(g(x)) \times g'(x)$ به ازای $x = 2$ کدام است؟

- $\frac{3}{2}$ (۱) $\frac{3}{4}$ (۲) $\frac{1}{6}$ (۳) $-\frac{1}{4}$ (۴)

۸. اگر تابع f بر روی \mathbb{R} مشتق‌پذیر باشد و $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+2) - 5}{h} = 8$ باشد. آنگاه مشتق تابع $y = x^2 f(\sqrt{1-3x})$ در $x = -1$ کدام است؟

- ۸ (۱) -۱۲ (۲) $-\frac{43}{4}$ (۳) -۱۶ (۴)

۹. هرگاه $f(x) = 3x - |3x|$ و $g(x) = 3x + 3\sqrt{x^2}$ باشند. مشتق تابع $f \circ g(x)$ کدام است؟

- ۱ (۱) صفر (۲) -۱ (۳) وجود ندارد. (۴)

۱۰. اگر $f(2) = 3f'(2) = 9$ و $fg(1) = g'(1) = 12$ باشند. شیب خط مماس بر نمودار تابع $y = (f(2x) + 3)g(x^2)$ در $x = 1$ کدام است؟

- ۳۰۶ (۱) ۱۵۳ (۲) ۱۶۲ (۳) ۳۶۰ (۴)

پاسخ‌نامه
کلیدی

- ۱ (1) (2) (3) (4) ۲ (1) (2) (3) (4) ۳ (1) (2) (3) (4) ۴ (1) (2) (3) (4) ۵ (1) (2) (3) (4) ۶ (1) (2) (3) (4) ۷ (1) (2) (3) (4) ۸ (1) (2) (3) (4) ۹ (1) (2) (3) (4) ۱۰ (1) (2) (3) (4)

ریاضی ۲ و ۳ | قوانین احتمال



۲۰ دقیقه

فصل ۱۷

ایستگاه ۳

۱. A و B دو پیشامد از فضای نمونه‌ای S هستند و $P(A-B) = \frac{2}{5}$ و $P(B-A) = \frac{1}{3}$ است. بیشترین مقدار $P(A) + P(B)$ چقدر از ماکزیمم $\frac{P(A)}{P(B)}$ بیشتر است؟

- (۱) $\frac{1}{5}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{15}$ (۴) $\frac{3}{5}$

۲. از مجموعه‌ی $\{1, 2, 3, \dots, 600\}$ یک عدد به تصادف انتخاب می‌کنیم. با کدام احتمال این عدد مضرب ۵ است ولی بر ۶ بخش پذیر نیست، یا مضرب ۵ نیست ولی بر ۶ بخش پذیر است؟

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{1}{32}$ (۳) $\frac{1}{36}$ (۴) $\frac{1}{4}$

۳. هرگاه $P(A-B) = \frac{2}{17}$ ، $P(B-A) = \frac{1}{17}$ ، $P(B) = nP(A)$ و $P(A|B) = \frac{1}{n+3}$ باشد، حاصل $P((A \cup B)')$ کدام است؟

- (۱) $\frac{2}{17}$ (۲) $\frac{3}{17}$ (۳) $\frac{4}{17}$ (۴) $\frac{5}{17}$

۴. هرگاه $\frac{7}{6}P(A') = 8P(B') = \frac{5}{6}$ باشد، کمترین مقدار $P(A' \cup B')$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{7}$ (۲) $\frac{1}{8}$ (۳) $\frac{1}{3}$ (۴) $\frac{1}{2}$

۵. اگر $P(A \cap B) = \frac{P(A)P(B)}{3} = \frac{P(A')}{4} = \frac{P(B')}{6}$ باشد، احتمال این که فقط یکی از دو پیشامد A یا B اتفاق بیفتد، از احتمال وقوع فقط A چقدر بیشتر است؟

- (۱) $\frac{2}{7}$ (۲) $\frac{3}{7}$ (۳) $\frac{4}{7}$ (۴) $\frac{5}{7}$

۶. از $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \sqrt[4]{x^3} < 27\}$ عددی به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال این که عدد انتخابی «فرد باشد ولی مضرب ۳ نباشد» چقدر است؟

- (۱) $\frac{27}{80}$ (۲) $\frac{26}{80}$ (۳) $\frac{13}{27}$ (۴) $\frac{26}{81}$

۷. هرگاه $\frac{P(A')}{4} = P(B-A) = \frac{P(A \cap B)}{3} = \frac{P(A-B)}{2}$ باشد، حاصل $P(B')$ چه کسری از $P(A \cup B')$ است؟

- (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{2}{9}$ (۴) $\frac{8}{9}$

۸. هرگاه $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ ، $P(A \cup B) = \frac{2}{5}$ و $P(A) = \frac{m+1}{2m+1}$ باشد، حدود m به صورت $[a, b]$ نوشته می‌شود. b-a کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) $\frac{4}{3}$ (۳) $\frac{5}{3}$ (۴) ۲

۹. A و B دو پیشامد ناسازگار هستند به طوری که $P(A) = \frac{1}{n+3}$ ، $P(B') = \frac{n}{n+1}$ و $P(A \cup B) = \frac{5}{2n+6}$ است. احتمال اتفاق نیفتادن A کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{3}{4}$ (۴) $\frac{5}{6}$

۱۰. ضرایب معادله‌ی $ax^2 - bx + c = 0$ را از مجموعه‌ی $\{1, 2, 3, 4\}$ انتخاب می‌کنیم. چقدر احتمال دارد مجموع ریشه‌ها دو برابر ضرب ریشه‌ها باشد یا یکی از ریشه‌ها ۱ باشد؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{7}{12}$ (۳) $\frac{2}{3}$ (۴) $\frac{3}{4}$

پاسخنامه
کلیدی

- ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

کنکور بدهید!

۵۰ دقیقه

آزمون جامع (۲)

آزمون ۹۷

۱. در یک دنباله‌ی هندسی با جملات مثبت، مجموع جملات پنجم و ششم برابر ۲۱ و مجموع جملات پنجم و هشتم برابر ۱۴۷ است.

جمله‌ی سوم این دنباله کدام است؟

(۱) $\frac{7}{12}$ (۲) $\frac{7}{27}$ (۳) $\frac{7}{83}$ (۴) $\frac{7}{108}$

۲. سه کارگر باید ساختمانی را تخریب کنند. کارگر A برای انجام این کار سه ساعت بیشتر از B و C (روی هم) نیاز دارد. کارگر B به تنهایی به اندازه‌ی وقتی که A و C با هم کار کنند نیازمند زمان است. اگر B به تنهایی کار کند هشت ساعت کمتر از دو برابر زمانی را صرف خواهد کرد که A به تنهایی برای تخریب ساختمان وقت نیاز دارد. اگر A، B و C با هم مشغول تخریب شوند، چه زمانی برای انجام تخریب خواهند داشت؟

(۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۶ (۴) ۸

۳. مخارج کسر $\frac{x^{25}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}+1}$ را گویا کرده و حاصل کسر برابر با $\sqrt{6}-\sqrt{2}+2$ شده است. مقدار x کدام است؟

(۱) ۱۶ (۲) ۲۵۶ (۳) ۸۱ (۴) ۶۲۵

۴. مجموعه جواب نامعادله‌ی $2x - 1 < |x| - x < 5x$ کدام بازه است؟

(۱) $(0, \frac{1}{2})$ (۲) $(0, \frac{1}{4})$ (۳) $(0, +\infty)$ (۴) $(-\infty, 0)$

۵. دامنه‌ی $y = \sqrt{n-x-x^2}$ به صورت $[m, 2]$ است. در این صورت اگر $g(x) = \frac{-mx}{1+x^2}$ و $f(x) = \frac{2x+2n-1}{4x+1}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} [(f \circ g)(x)]$ کدام است؟ ([] نماد جزء صحیح است.)

(۱) -۱ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۶. نمودار یک سهمی از نقاط $(-3, -1)$ ، $(-1, -2)$ و $(2, 4)$ می‌گذرد. اگر این سهمی از نقطه‌ی $(-4m, m)$ هم بگذرد، مقدار m کدام می‌تواند باشد؟

(۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $-\frac{1}{8}$ (۳) $-\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{1}{8}$

۷. در مثلث ABC، $\sin A + \cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $AC = 2\sqrt{2}$ و $AB = 3$ است. مساحت این مثلث کدام است؟

(۱) $\frac{\sqrt{3}+3}{2}$ (۲) $\frac{3\sqrt{3}+1}{2}$ (۳) $\frac{3\sqrt{3}+2}{2}$ (۴) $\frac{3\sqrt{3}+3}{2}$

۸. یک نان سنگک، یک نان بربری و یک نان لواش را به چند طریق می‌توان بین ۵ نفر تقسیم کرد، به طوری که افراد دریافت‌کننده‌ی نان، دقیقاً یک عدد نان دریافت کنند؟

(۱) $C(5, 3)$ (۲) $C(5, 4)$ (۳) $P(5, 2)$ (۴) $P(5, 3)$

۹. چهار سکه را پرتاب می‌کنیم. اگر سکه‌ی اول رو و سکه‌ی دوم پشت آمده باشد، احتمال آن که آخرین سکه پشت بیاید، کدام است؟

(۱) $\frac{1}{8}$ (۲) $\frac{1}{6}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{1}{2}$

۱۰. اگر $f(x) = \frac{1}{1+\sqrt{x}}$ و $g(x) = \sqrt{\frac{1}{x}-1}$ بوده و برای جمع و ضرب جواب‌های معادله‌ی $g(x) + \sqrt{f^{-1}(x)} = \frac{a}{x}$ رابطه‌ی

$S + 120P = 0/5$ برقرار باشد، مقدار a کدام می‌تواند باشد؟ (S مجموع جواب‌ها و P حاصل ضرب آنها است.)

(۱) -۱ (۲) $\frac{61}{60}$ (۳) $\frac{31}{30}$ (۴) $-\frac{31}{30}$

پاسخنامه
کلیدی

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

آزمون شماره ۲۳

۱. گزینه ۳

راهنبرد: اگر a عددی صحیح باشد، آن وقت:

معمولی	لج‌باز یکی بیشتر!
$[u] < a \Rightarrow u < a$	$[u] \leq a \Rightarrow u < a + 1$
$[u] \geq a \Rightarrow u \geq a$	$[u] > a \Rightarrow u \geq a + 1$

۱ $4 - [x] \geq 0 \Rightarrow [x] \leq 4 \Rightarrow x < 5 \Rightarrow D_f = (-\infty, 5)$

۲ $[x] - 1 > 0 \Rightarrow [x] > 1 \Rightarrow x \geq 2 \Rightarrow D_g = [2, +\infty)$

$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\} = \{x < 5 \mid \sqrt{4 - [x]} \geq 2\}$
 $= \{x < 5 \mid \underbrace{4 - [x]}_{[x] \leq 0} \geq 4\} = \{x < 5 \mid x < 1\} = \{x \mid x < 1\}$

۲. گزینه ۱

$f(0) = 2 \xrightarrow{\text{در ضابطه}} 2 = [a(0)] + b \Rightarrow b = 2$
 از شکل

در $f(x) = [ax] + 2$ طول هر پله $\frac{1}{a}$ و طبق شکل ۲ واحد

$\frac{1}{a} = 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$ است؛ پس:

جای‌گذاری در معادله $\rightarrow [x] + |x - 1| = 2$

حالت اول:

$[x] + |x - 1| = 2 \Rightarrow |x - 1| = 2 - [x] \Rightarrow x \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow x + |x - 1| = 2 \Rightarrow |x - 1| = 2 - x$

غ‌ق $x = \frac{3}{2}$ حل معادله

حالت دوم:

$[x] + |x - 1| = -2 \Rightarrow x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x + |x - 1| = -2$

غ‌ق $x = -\frac{1}{2}$ حل معادله $\Rightarrow |x - 1| = -2 - x$

۲. گزینه ۴

خروج عدد صحیح

$[|2x - 1| - 2] = -1 \Rightarrow [|2x - 1|] - 2 = -1$

$\Rightarrow [|2x - 1|] = 1 \Rightarrow 1 \leq |2x - 1| < 2$


۱ $|2x - 1| < 2 \Rightarrow -2 < 2x - 1 < 2 \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$

۲ $|2x - 1| \geq 1 \Rightarrow 2x - 1 \geq 1$ یا $2x - 1 \leq -1$

$\Rightarrow x \geq 1$ یا $x \leq 0$

و اشتراک ۱ و ۲ می‌شود: $-\frac{1}{2} < x \leq 0$ یا $1 \leq x < \frac{3}{2}$

و اما رسم نمودار هر دو تابع در یک دستگاه مختصات:



معادله ۲ ریشه دارد. \Rightarrow ریشه‌های قدر مطلق‌ها

x	-2	-1	0	2	3
y	$\frac{25}{3}$	5	$\frac{7}{3}$	5	$\frac{25}{3}$

min

می‌توانید نمودارش را هم بعداً بکشید!...

۹. گزینه ۴

راهنبرد: ماکزیمم تابع $y = c - |ax + b|$ و مینیمم

$y = c + |ax + b|$ به‌ازای ریشه‌ی قدر مطلق به دست می‌آید.

$g(x) = a - 1 - |x - 1| \xrightarrow{x=1} \text{ریشه‌ی قدر مطلق} \rightarrow \max(g) = a - 1$

$\Rightarrow a - 1 = \frac{7}{3} \Rightarrow a = \frac{10}{3}$


۱۰. گزینه ۳ نمودار دو تابع $y_1 = |x - 2| - |x + 1|$ و

$y_2 = ax + ab$ باید در بی‌شمار نقطه یکدیگر را قطع کنند،

یعنی در یک محدوده‌ای باید برهم منطبق شوند، پس:

$y_1 = |x - 2| - |x + 1| \Rightarrow$

x	-2	-1	2	3
y_1	3	3	-3	-3



ضابطه‌ی تابع y_1 برای $-1 < x < 2$ ، به‌صورت زیر ساده می‌شود:

$y_1 = -(x - 2) - (x + 1) = -2x + 1$

بنابراین برای این که تابع y_2 بر تابع y_1 منطبق شود، باید

ضابطه‌ی آن به‌صورت $-2x + 1$ باشد، یعنی:

$\begin{cases} a = -2 \\ ab = 1 \end{cases} \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$

تذکر: چون a مخالف صفر است، پس y_2 نمی‌تواند بر قسمت ثابت تابع y_1 منطبق شود.

گزینه ۳

زاویه‌ی خط با جهت مثبت محور x ها $= 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

شیب $\rightarrow \tan 60^\circ = m \Rightarrow m = \sqrt{3}$

عرض از مبدا $(0, k + \sqrt{3}) \rightarrow y - (k + \sqrt{3}) = \sqrt{3}(x - 0)$

صدق بد $(-1, 2k - 1) \rightarrow (2k - 1) - (k + \sqrt{3}) = \sqrt{3}(-1)$

$\Rightarrow k - 1 - \sqrt{3} = -\sqrt{3} \Rightarrow k = 1$

جای گذاری $\rightarrow y - (1 + \sqrt{3}) = \sqrt{3}x$

وارون خط $\rightarrow x - (1 + \sqrt{3}) = \sqrt{3}y \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{3}}x - \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

$f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 1 - \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 1) - 1$

گزینه ۲

راهبرد: قطر کوچک شش ضلعی منتظم به اضلاع روبه‌رو عمود است. اندازه‌ی قطر کوچک $\sqrt{3}a$ و قطر بزرگ $2a$ است.

فرض $S_{\Delta ABC} = \frac{\sqrt{3}a \times a}{2} = 6\sqrt{3}$

$\Rightarrow a^2 = 12$

فیثاغورس $\rightarrow r^2 = a^2 - \frac{a^2}{4}$

$= \frac{3a^2}{4} \Rightarrow r = \frac{\sqrt{3}a}{2}$

رنگی $S = \frac{S - \text{دایره } S}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 - \pi \left(\frac{3a^2}{4} \right) \right)$

$a = 2\sqrt{3} \rightarrow \frac{1}{2} (18\sqrt{3} - 9\pi) = 9\sqrt{3} - \frac{9\pi}{2}$

گزینه ۱

رنگی $S = \frac{1}{8} S_{\text{کل}} \Rightarrow \frac{1}{2} \times 1 \times 3 \sin \alpha$

$= \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} (x + 3)(6) \sin \alpha \Rightarrow x + 3 = 4 \Rightarrow x = 1$

$S_{\Delta ABC} = 3S_{\Delta ACD}$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 6 \times AC \times \sin 30^\circ$

$= 3 \times \frac{1}{2} \times 3 \times AC \sin \alpha$

$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \rightarrow 3 = 9 \sin \alpha \Rightarrow \sin \alpha = \frac{1}{3}$

گزینه ۱


$\Delta ABC: AB = \frac{1}{2} BC = \frac{\sqrt{5x+3}}{2}$

$\Delta ABC: AB = \frac{\sqrt{2}}{2} BD \Rightarrow \frac{\sqrt{5x+3}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x+1)$

به توان ۲ $\rightarrow 5x + 3 = 2(x^2 + 2x + 1) \Rightarrow 2x^2 - x - 1 = 0$


ریشه‌ها $\rightarrow x = 1, -\frac{1}{2}$

$\widehat{B_1} = 45^\circ \Rightarrow \Delta ABD$ متساوی الساقین $\Rightarrow AD = AB$



فیثاغورس $\rightarrow (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2} + y)^2 = (\sqrt{8})^2$

$\Rightarrow \sqrt{2} + y = \sqrt{6} \Rightarrow y = \sqrt{6} - \sqrt{2}$



فیثاغورس $\rightarrow \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + y\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$\frac{\sqrt{2}}{4} + y = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}} \Rightarrow y = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}} - \frac{\sqrt{2}}{4}$

مقدار به دست آمده برای y در گزینه‌ها نیست.

آزمون شماره ۴۱

گزینه ۲

بیمانر $\frac{1}{18} \cot \alpha = \frac{\cos(-210^\circ) + \cot(240^\circ)}{\tan(720^\circ) - \tan(-600^\circ)}$

$= \frac{\cos(180^\circ + 30^\circ) + \cot(180^\circ + 60^\circ)}{\tan(2 \times 360^\circ) + \tan(\frac{540^\circ}{3 \times 180^\circ} + 60^\circ)}$

$\Rightarrow \frac{1}{18} \cot \alpha = \frac{-\cos 30^\circ + \cot 60^\circ}{0 + \tan 60^\circ}$

$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{1}{18} \cot \alpha = -\frac{1}{6} \Rightarrow \cot \alpha = -3$

آزمون شماره ۹۷

۱. گزینه ۱

$$\begin{cases} a_5 + a_6 = 21 \Rightarrow a_1 q^4 + a_1 q^5 = 21 \\ a_5 + a_8 = 147 \Rightarrow a_1 q^4 + a_1 q^7 = 147 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{تقسیم}} \frac{a_1 q^4 (1+q)}{a_1 q^4 (1+q^3)} = \frac{21}{147}$$

$$\Rightarrow \frac{1+q}{1+q^3} = \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{1+q}{(1+q)(1-q+q^2)} = \frac{1}{7}$$

$$\Rightarrow 1-q+q^2 = 7 \Rightarrow q^2 - q - 6 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} q=3 \Rightarrow a_1 (3)^4 (1+3) = 21 \Rightarrow a_1 = \frac{7}{3^3 \times 4} \\ q=-2 \times \end{cases}$$

$$a_7 = a_1 q^6 = \left(\frac{7}{3^3 \times 4}\right)(9) = \frac{7}{3 \times 4} = \frac{7}{12}$$

۲. گزینه ۱

۱ A برای انجام کار سه ساعت بیشتر از B و C نیاز دارد:

$$\frac{1}{t_B} + \frac{1}{t_C} = \frac{1}{t_A - 3}$$

۲ B به اندازه‌ی A و C کار می‌کند:

$$\frac{1}{t_A} + \frac{1}{t_C} = \frac{1}{t_B}$$

۳ B هشت ساعت کمتر از دو برابر A زمان صرف می‌کند:

$$t_B = 2t_A - 8 : (t_A > 4)$$

$$\xrightarrow{1-2} \frac{1}{t_B} - \frac{1}{t_A} = \frac{1}{t_A - 3} - \frac{1}{t_B}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{t_B} = \frac{1}{t_A - 3} + \frac{1}{t_A}$$

$$\xrightarrow{3} \frac{2}{2t_A - 8} = \frac{1}{t_A - 3} + \frac{1}{t_A}$$

$$\xrightarrow{\text{حل معادله}} t_A = 2 \times t_A = 6 \Rightarrow \begin{cases} t_B = 4 \\ t_C = 12 \end{cases}$$

$$\text{خواسته‌ی سؤال: } \frac{1}{t_{\text{کل}}} = \frac{1}{t_A} + \frac{1}{t_B} + \frac{1}{t_C}$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{2} \Rightarrow t_{\text{کل}} = 2 \text{ ساعت}$$


$$\xrightarrow{\text{مشتق}} f'(x) = \frac{1 - \frac{3}{2}\sqrt{x}}{2\sqrt{x-x\sqrt{x}}} \xrightarrow{f'=0} \sqrt{x} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow x = \frac{4}{9}$$

$$\xrightarrow{\text{در تابع بنذار}} y = \sqrt{\frac{4}{9} - \frac{4}{9}\sqrt{\frac{4}{9}}}$$

$$= \frac{2}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \Rightarrow y_{\text{max}} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

۳. گزینه ۲ دایره‌ی C و خط را قطع می‌دهیم تا مختصات نقاط A و B به دست آید:



$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x = 3 \\ y = 3 - x \end{cases} \xrightarrow{\text{تلاقی}} x^2 + (3-x)^2 - 2x = 3$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 8x + 6 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow (x-3)(x-1) = 0 \Rightarrow x = 1, 3$$

$$\xrightarrow{\text{در خط}} A(1, 2), B(3, 0)$$

چون دایره‌ی C' از نقطه‌ی (1, 0) نیز گذشته است، حال معادله‌ی دایره‌ی را می‌نویسیم که از سه نقطه می‌گذرد:

$$C': x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(1, 2) \xrightarrow{C'} \rightarrow 1 + 4 + a + 2b + c = 0 \\ B(3, 0) \xrightarrow{C'} \rightarrow 9 + 0 + 3a + 0 + c = 0 \\ C(1, 0) \xrightarrow{C'} \rightarrow 1 + 0 + a + 0 + c = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b + c = -5 \\ 3a + c = -9 \\ a + c = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + c = -9 \\ a + c = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -4 \\ c = 3 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{در اولی}} -4 + 2b + 3 = -5 \Rightarrow b = -2$$

$$\xrightarrow{\text{فرمول شعاع } C'} r = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 - 4c}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{16 + 4 - 12} = \frac{1}{2} \sqrt{8} = \sqrt{2}$$

الف) توابع یک به یک معروف: $y = \sqrt{ax+b}$ ، $y = ax^3 + b$ ، $y = ax + b$ و $y = \log_c(ax+b)$ با شرط $a \neq 0$ ، $c > 0$ و $c \neq 1$ و تابع نمایی $y = a^{mx+h}$ با شرط $m \neq 0$.

ب) توابع غیر یک به یک معروف: $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)، تابع ثابت $y = c$ ، $y = |ax + b|$ ، تابع جزء صحیح $y = [ax + b]$ و توابع مثلثاتی $y = \sin x$ ، $y = \cos x$ و $y = \tan x$.

برای تابع‌های غیر یک به یک می‌توانید با ارائه‌ی محدوده‌ای برای x ، کاری کنید که تابع در آن بازه یک به یک گردد؛ بهترین شیوه برای به دست آوردن این بازه معمولاً رسم نمودار تابع است...

۴ وارون تابع و ویژگی‌هایش

الف) مفاهیم مقدماتی تابع وارون: اگر جای مؤلفه‌ها را در زوج مرتب‌های تابع f عوض کنیم به وارون تابع می‌رسیم و چنانچه این وارون خودش تابع باشد به آن تابع وارون می‌گوییم و نمادش هم f^{-1} است، پس شرط وارون پذیری تابع f ، یک به یک بودن آن است.

برای رسم نمودار f^{-1} از روی نمودار f ، کافی است نمودار تابع را نسبت به $y = x$ قرینه کنید.

اگر جای دامنه و برد را در f عوض کنید، دامنه و برد f^{-1} به دست می‌آید. **مدل ریاضی** $D_{f^{-1}} = R_f$ و $R_{f^{-1}} = D_f$

ب) پیدا کردن ضابطه‌ی تابع وارون:

در ضابطه‌ی تابع ابتدا جای x و y را عوض کنید و بعد سعی کنید y را بر حسب x پیدا کنید.

$$y = \frac{x+1}{x} \xrightarrow{\text{جابه‌جا}} x = \frac{y+1}{y} \Rightarrow y+1 = xy \Rightarrow y(1-x) = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{x-1}$$

ضابطه‌ی تابع وارون

اگر برد تابع f محدود باشد، بعد از پیدا کردن ضابطه‌ی تابع وارون، در کنارش محدوده‌ی برد f را هم بنویسید...

$$y = 1 - \sqrt{x} \xrightarrow{\text{جابه‌جا}} x = 1 - \sqrt{y} \xrightarrow{\text{توان ۲}} y = (x-1)^2 \Rightarrow f^{-1}(x) = (x-1)^2, \quad x \leq 1$$

برد f

روش تستی: اگر ضابطه‌ی تابع وارون f را خواسته باشند، در تابع f خودتان (که دارید) مقداری دلخواه به x داده و y را پیدا کنید؛ مثلاً $f(a) = b$ حالا گزینه‌ای درست است که اگر به x آن بدهیم b حاصل تابع بشود a ؛ درست برعکس!

پ) وارون تابع درجه دو:

تابع $y = ax^2 + bx + c$ وارون پذیر نیست (چون یک به یک نیست) پس با ارائه‌ی محدوده‌ای مناسب وارون پذیر می‌شود که عبارت است از:

یک بازه‌ی قبل از $-\frac{b}{2a}$ یا بازه‌ی بعد از آن؛ بعد با روش مربع کامل کردن وارونش را پیدا کنید:

$$y = x^2 - 4x + 1, x \geq 2 \xrightarrow{\text{مربع کامل}} y = (x-2)^2 - 4 + 1 = (x-2)^2 - 3 \xrightarrow{\text{جابه‌جا}} x = (y+3)^2 - 2$$

$$\Rightarrow (y+3)^2 = x+2 \xrightarrow{\text{جذر}} |y+3| = \sqrt{x+2} \xrightarrow{\text{در وارون می‌شود } y > 2} y+3 = \sqrt{x+2} \Rightarrow y = \sqrt{x+2} - 3$$

۵ عملیات جبری و ترکیب روی دو تابع

الف) دامنه و ضابطه:

$D = D_f \cap D_g$	$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$	$f+g$
	$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$	$f-g$
	$(fg)(x) = f(x)g(x)$	$f \cdot g$
$D = D_f \cap D_g - \{x \mid g(x) = 0\}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f}{g}$
$D = \{x \mid x \in D_g, g(x) \in D_f\}$	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$	$f \circ g$

۴۵ دوره‌ی تناوب‌های خاص

دوره تناوب تابع‌های $f(x) = a \tan(bx + c) + d$ ، $g(x) = a \sin^2(bx + c) + d$ ، $h(x) = a \cos^2(bx + c) + d$ و همچنین $y = |a \sin(bx + c)|$ و $y = |a \cos(bx + c)|$ همگی $T = \frac{\pi}{|b|}$ است.

۴۶ فرمول‌های معادله‌های مثلثاتی


اول معادله را با روابط مثلثاتی (اصلی، $\frac{k\pi}{2} + \alpha$ ، 2α و طلایی) ساده کنید.

$\sin u = \sin v \Rightarrow u = 2k\pi + v, u = 2k\pi + \pi - v$	دو نسبت هم‌نام مساوی دارید.
$\cos u = \cos v \Rightarrow u = 2k\pi \pm v$	دو نسبت غیرهم‌نام مساوی دارید.
حالت اول $\sin u = \cos v \Rightarrow \sin u = \sin(\frac{\pi}{2} - v) \Rightarrow$ کمان یکی را متمم کنید.	
$a \sin^2 u + b \sin u + c = 0$: فرض کنید $\sin u = t$ و معادله‌ی درجه‌ی دوم را حل کنید.	خود معادله، درجه‌ی دوم است.
$a \cos^2 u + b \cos u + c = 0$: فرض کنید $\cos u = t$ و معادله‌ی درجه‌ی دوم را حل کنید.	
اگر $\sin^2 u$ و $\cos u$ در معادله حضور دارند، به جای $\sin^2 u$ بگذارید $1 - \cos^2 u$ و هم‌چنین اگر $\cos^2 u$ و $\sin u$ با هم دیده شوند، به جای $\cos^2 u$ بگذارید $1 - \sin^2 u$...	
اگر $\sin u$ و $\cos 2u$ در معادله حضور دارند؛ به جای $\cos 2u$ بگذار $1 - 2\sin^2 u$	ظرافت 2α
اگر $\cos u$ و $\cos 2u$ در معادله حضور دارند؛ به جای $\cos 2u$ بگذار $2\cos^2 u - 1$	

۴۷ جواب‌های خاص معادله‌ی مثلثاتی

	۰	۱	-۱
$\sin x$	$x = k\pi$	$x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$	$x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$
$\cos x$	$x = k\pi + \frac{\pi}{2}$	$x = 2k\pi$	$x = 2k\pi + \pi$

۴۸ کمان‌های معروف



د

۴۹ فرمول‌های مقدماتی

$x \rightarrow a^-$	$x \rightarrow a^+$	تابع f در $x \rightarrow a$ دارای حد است.	$f(x)$ بر $ax + b$ بخش پذیر است.	باقی مانده‌ی $f(x)$ بر $ax + b$
$x < a$	$x > a$	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \text{عدد}$	$f(-\frac{b}{a}) = 0$	$r = f(-\frac{b}{a})$

۵۰ روش‌های محاسبه‌ی حد

$\lim_{x \rightarrow a} (f \pm g)(x) = \ell \pm m$	اگر $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ و $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$
$(k \in \mathbb{N}), \lim_{x \rightarrow a} f^k(x) = \ell^k$ و در نتیجه $\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = \ell m$	
$(m \neq 0) \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\ell}{m}$	
حد راست تابع f را از شاخه‌ی بالا (که جلوش $x > a$ است) و حد چپ را از شاخه‌ی پایینی (که جلوش $x < a$ است) پیدا کنید.	$f(x) = \begin{cases} g(x) & x > a \\ h(x) & x < a \end{cases}$
اگر $x = a$ باعث صفرشدن u می‌شود، حد راست و چپ را جداگانه حساب کنید.	$f(x) = \lim_{x \rightarrow a} u $
اگر $x = a$ باعث عدد صحیح‌شدن u می‌شود، حد راست و چپ را جداگانه حساب کنید.	$f(x) = \lim_{x \rightarrow a} [u]$
در جبری‌ها، هویپتال بزن (!) و یا صورت و مخرج را بر $x - a$ تقسیم کنید و به جای هر کدام خارج قسمت تقسیم را بگذارید.	رفع ابهام $\frac{0}{0}$
در رادیکالی‌ها، هویپتال بزن (!) و یا صورت و مخرج را در لنگه‌ی لازم گویا کردن ضرب کنید.	
سعی کنید با روابط مثلثاتی عبارتی را برای ساده‌شدن از صورت و مخرج ایجاد کنید.	
اگر کمان به صفر میل می‌کند، قرار دهید $\sin^n u = u^n$ و	
$1 - \cos^m u \sim m \frac{u^2}{2}$	
در مثلثاتی‌ها	
وقتی $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{عدد غیر صفر}}{\text{صفر حدی}}$ ایجاد شده، جواب می‌شود ∞ ، بعدش مخرج را در اطراف $x = a$ تعیین علامت کنید.	حد نامتناهی
به جای هر چند جمله‌ای، فقط جمله‌ای که بزرگترین توان را دارد نگه دارید و مابقی را حذف کنید. (پرتوان) $ax^n + bx^{n-1} + \dots \sim ax^n$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k}{x^n} = 0$ ($n \in \mathbb{N}$)	حد در بی‌نهایت
اول $\lim_{x \rightarrow a} u$ را حساب کنید اگر ℓ شد، تعیین کنید l^+ است یا l^- و بعد $f(l^\pm)$ را...	$\lim_{x \rightarrow a} f(u)$

۵۱ حد کسر خاص

نتیجه بگیرید $f(a) = 0$ بوده و بعد کسر را رفع ابهام کنید.	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\text{صفر حدی}} = \text{عدد}$
نتیجه بگیرید $f(a) = 0$ بوده و بعد کسر را رفع ابهام کنید.	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{صفر حدی}}{f(x)} = \text{عدد غیر صفر}$
نتیجه بگیرید $m = n$ بوده است. جواب صفر کسر یعنی $m > n$!	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^n + bx^{n-1} + \dots}{a'x^m + b'x^{m-1} + \dots} = \text{عدد غیر صفر}$
نتیجه بگیرید $\frac{c}{a} = m^2, -\frac{b}{a} = 2m$ (مخرج بوده) ریشه‌ی مضاعف $x = m$	$\lim_{x \rightarrow m} \frac{\text{دایره}}{ax^2 + bx + c} = +\infty$ یا $-\infty$

۸۲ قوانین احتمال پیشرفته

$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ یا $P(A B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$ = احتمال اتفاق افتادن A مشروط به اتفاق افتادن B و یا		احتمال شرطی
$P(A-B) = P(A) - P(A)P(B)$	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$	پیشامدهای مستقل
$P(A \cap B) = P(A)P(B A)$: احتمال اولی (مجزا) ضربدر احتمال دومی (با شرط این که اولی اتفاق افتاده باشد)		پیشامدهای غیرمستقل
<p>در نمودار</p> <p>حالت ۱ $\rightarrow P_1$ (حالت مطلوب اتفاق دوم) $\rightarrow P_2$ حالت ۲ $\rightarrow P_2$ (حالت مطلوب اتفاق دوم) $\rightarrow P_1$</p> <p>جواب می شود $P_1 P_2 + P_2 P_1$ ، اتفاق اول</p>		احتمال کل
<p>نحوه‌ی کشیدن فلش‌های احتمال کل:</p> <p>ظرف اول m تا بردار ظرف دوم n تا بردار ظرف جدید $m+n$ تا دارد</p> <p>ظرف جدید</p> <ul style="list-style-type: none"> حالت مطلوب \rightarrow مال اولی $\frac{m}{m+n}$ حالت مطلوب \rightarrow مال دومی $\frac{n}{m+n}$ 		ساختن ظرف جدید

۸۴ تکنیک‌های احتمال

$P(A) = \frac{\binom{n}{k}}{2^n}$	در خانواده‌ای با n فرزند؛ احتمال داشتن k تا پسر = احتمال داشتن k تا دختر	تست‌های دختر پسری
	در پرتاب n بار سکه؛ احتمال آمدن k بار رو = احتمال آمدن k بار پشت	
$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ و در نتیجه: $P(A \cap B) = 0$		پیشامدهای ناسازگار
اگر بخواهید مجموع دو تاس بشود m به طوری که $m \leq 7$ است؛ تعداد حالت‌ها می‌شود: $m-1$. اگر بخواهید مجموع دو تاس بشود n به طوری که $n \geq 7$ است؛ تعداد حالت‌ها می‌شود $13-n$.		مجموع دو تاس

آمار

۸۵ انواع متغیرها

کمی گسسته	کمی پیوسته	کیفی اسمی	کیفی ترتیبی
متغیر را می‌توانید بشمارید	متغیر قابل اندازه‌گیری است	فقط نوع یا وضعیت متغیر قابل بیان است	در نوع متغیر یک ترتیب طبیعی می‌بینید

۸۶ شاخص‌های آماری

$cv = \frac{\sigma}{\bar{x}}$	$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$	$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$	$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$	$R = \max - \min$
ضریب تغییرات	انحراف معیار	واریانس	میانگین	دامنه تغییرات